Attitude van de risicopatiënt tegenover jaarlijkse griepvaccinatie

Haio: WILMS Bart , KUL
Promotor:
Praktijkopleider: BOLLEN Hilde , ENGELBEEN Thomas

Context: De patiënten met verhoogd risico op complicaties bij een griepinfectie zouden jaarlijks gevaccineerd moeten worden. Momenteel is er geen andere preventieve maatregel die in dezelfde mate griep kan voorkomen dan vaccinatie. Binnen het grote publiek twijfelen er de laatste jaren meer mensen om zichzelf of hun kinderen het basisvaccinatieschema te laten volgen. De laatste jaren stagneert ook de griepvaccinatiegraad in de risicogroepen in België en de buurlanden. De SAGE-werkgroep van de WHO ontwikkelde een model om 'vaccine hesitancy' te objectiveren, beschrijven en aan te pakken. Dit continuüm aan vaccinatie-twijfel omvat drie conceptuele peilers: Zelfvoldoening, Vertrouwen in vaccins en Gemak van vaccinatie. Om in 2020 de griepvaccinatiegraaddoelstelling van 75% in de risicopopulatie te behalen, moet er onderzoek gebeuren naar de drijfveren van twijfel binnen de Belgische context en de onderliggende determinanten hiervan.

Onderzoeksvraag: 1) Wat zijn de bezorgdheden en verwachtingen van de risicopatiënt over griep en griepvaccinatie? 2) Wat zijn de drempels die mensen tegenhouden om zich te laten vaccineren? 3) Zijn er determinanten die deze houding tegenover griepvaccinatie voorspellen?

Methode: In drie Limburgse huisartsenpraktijken werd bij risicopatiënten een anonieme vragenlijst afgenomen omtrent attitudes tegenover jaarlijkse griepvaccinatie. Er werd gevraagd naar demografische en medische achtergrondinformatie, vaccinatiestatus. Negen stellingen over griepvaccinatie moesten beoordeeld worden aan de hand van een 5-punts-Likertschaal. De belangrijkste motivator en/of drempel werd bevraagd. Een univariate regressieanalyse werd uitgevoerd op de gegeven antwoorden op de stellingen om determinanten van een geslaagde griepvaccinatie te bepalen.

Resultaten: Er waren 188 respondenten, waar van 119 tot de risicogroep behoorden. De belangrijkste motivator was voor 47% de aanbeveling door de arts. Van de ondervraagde risicopatiënten kon 52% geen drempel bedenken. Reden voor niet-vaccinatie waren voor 19% vergeetachtigheid en voor 10% angst voor nevenwerkingen. De attitude 'Griepvaccinatie is belangrijk voor mijn algemene gezondheid' was de belangrijkste voorspeller voor een correcte vaccinatie. Patiënten die vaker de huisarts consulteerden waren vaker correct gevaccineerd. (OR 3.48, CI 1.3 -9.79) Een éénmalig call-recallsysteem heeft een effect op de vaccinatiegraad dat persisteert tot na minstens 2 griepseizoenen.

Conclusie: De huisarts heeft een sleutelrol in het motiveren van risicopatiënten om zich te laten vaccineren en om bij een minderheid van de patiënten drempels weg te nemen door de nadruk te leggen op een veilig, effectief vaccin dat belangrijk is voor de algemene gezondheid.