Pneumokokkenvaccinatie bij de volwassene: factoren die de beslissing tot vaccinatie bij huisartsen be?nvloeden

Haio: LOUWIES Karlijn , KUL
Promotor: MATHEÏ Cathy
Praktijkopleider: VANDELOO Kara , WEYTJENS Lud

Context: De pneumokok is een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit. Ondanks de nieuwe aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad blijft de vaccinatiegraad in België erg laag. Daarom tracht men in deze studie meer inzicht te verwerven in de factoren die bij huisartsen de beslissing tot vaccinatie be?nvloeden.

Onderzoeksvraag: Welke factoren be?nvloeden de beslissing tot vaccinatie bij huisartsen?

Methode: Voor dit kwalitatief onderzoek werden semi-gestructureerde interviews afgenomen bij tien huisartsen in Vlaanderen. De interviews werden getranscribeerd en verwerkt door middel van thematische analyse.

Resultaten: Pneumokokkenvaccinatie wordt door alle bevraagde artsen zinvol geacht. Toch vermelden zij ook verschillende barri?res die de lage vaccinatiegraad kunnen verklaren. Zo wordt de hoge kostprijs van het vaccin als de belangrijkste barri?re beschouwd voor vaccinatie. Andere belangrijke patiëntgebonden barri?res zijn het gebrek aan kennis bij patiënten over het vaccin en dat de patiënten denken dat ze het vaccin niet nodig hebben. Als artsgebonden barri?res geven de artsen de lage prioriteit van pneumokokkenvaccinatie in de huisartsenpraktijk aan en het gebrek aan kennis bij artsen over de nieuwe aanbevelingen. De belangrijkste interventie om de vaccinatiegraad te verhogen is voor de bevraagde artsen dan ook het verlagen van de kostprijs en/of het verhogen van de terugbetaling van het vaccin. Ook het verhogen van de kennis bij zowel de artsen als de patiënten wordt als effectief beschouwd door de artsen. Nochtans ziet men dat na het geven van een korte opleiding omtrent de huidige aanbevelingen en evidentie de twijfel omtrent de effectiviteit van het vaccin eerder toeneemt bij de deelnemende artsen. Over het uitbesteden van vaccinatie aan andere beroepsgroepen zijn de meningen verdeeld.

Conclusie: In deze studie komen er verschillende barri?res naar boven voor pneumokokkenvaccinatie bij volwassenen. Om in de toekomst de vaccinatiegraad te verhogen zullen interventies gepland moeten worden die inspelen op deze barri?res.