Teledermatologie

Haio: DEGRANDE Justine , KUL
Promotor: AVONTS Dirk
Praktijkopleider: MOERMAN Hilde

Context: Dermatologische pathologie is de derde meest voorkomende klacht binnen de huisartssetting. Huidproblemen beslaan een grote deel van het takenpakket binnen de eerste lijn. Literatuur geeft weer dat benigne tumoren, acne vulgaris, nonmelanoma skincancer en contactdermatitis de meest doorgestuurde pathologie?n zijn naar de dermatoloog. Lange wachttijden tot het verkrijgen van een consult bij de dermatoloog, minder toegankelijk zijn van de tweedelijn voor immobiele of RVT patiënten en onterecht weghalen van eerstelijns dermatologische problemen zijn onterecht voorkomende obstakels. Het pilootproject Teledermatologie onder leiding van dr. Roegies tracht door middel van teleconsulten hierop een antwoord te vinden. Dit project, reeds tien jaar lopend in Nederland zorgt dat digitale consulten voorzien van beeldmateriaal, bijbehorende anamnese en therapeutische en/of diagnostische vraag veilig worden verstuurd via het software programma KSYOS. Een meewerkend teledermatoloog antwoordt binnen de 24 uur.

Onderzoeksvraag: Deze manama kijkt naar de haalbaarheid en toepasbaarheid van deze tool Teledermatologie. Er wordt nagegaan of een specifieke groep baat heeft bij Teledermatologie en of ze ook relevante diagnose oplevert.

Methode: Van eind december 2015 tot eind maart 2016 liep in de huisartsenpraktijk in Lauwe een voorstudie om de zwakke plekken binnen dermatologie bloot te leggen. Begin april 2016 startte het pilootproject. Tot midden december 2016 includeerde ik 32 patiënten die deelnamen aan het pilootproject Teledermatologie. In deze periode gebeurde een tussentijdse en eindevaluatie tussen huisarts en teledermatoloog. Via een vragenlijst werd naar haalbaarheid en tevredenheid gepeild bij de patiënten.

Resultaten: 18/32 teleconsulten hoefden geen verwijzing. 2/18 werden alsnog verwezen. 14/32 teleconsulten hadden verwijzing nodig. 3/14 patiënten vonden dit niet nodig. (pre)Maligniteit (8/32), eczeem (6/32) en mycose (3/32) werden achtereenvolgens het meest frequent teledermatologisch gezien. Huisarts en dermatoloog spendeerden 5-10 minuten aan het opstellen en/of beantwoorden van een teleconsult. Patiënten waren 100 % (32/32) tevreden over deze tool.

Conclusie: Teledermatologie kon 56 % van de teleconsulten beantwoorden zonder verwijzing. Voor de patiënt is dit een goede tool. Arts en huisarts kennen deze tool een toekomst toe mits verloning en implementatie vanuit het medisch dossier. Verder onderzoek dient nog te gebeuren.