# Het aanbieden van de HPV zelftest door de huisarts aan niet-gescreende vrouwen: wat is de impact op de participatiegraad? Een pilootstudie in een huisartsenpraktijk in Gent

**Haio:** DE MAESSCHALCK Ann-Sophie , U.G.
**Promotor:** Verhoeven Veronique , U.A.
**Praktijkopleider:**

**Context:** De richtlijn in België, in de screening naar baarmoederhalskanker, is om bij vrouwen van 25 tot en met 64 jaar elke drie jaar een baarmoederhalsuitstrijkje uit te voeren. Toch blijkt dat in 2015 39,5% zich niet liet screenen. De laatste jaren wordt mondiaal meer en meer gebruik gemaakt van een primaire HPV-test in plaats van het baarmoederhalsuitstrijkje. Hiervoor bestaat zelfs een HPV-zelftest applicatie.

**Onderzoeksvraag:** In een pilootonderzoek in een huisartsenpraktijk willen we onderzoeken of de participatiegraad in de screening naar baarmoederhalskanker kan verhoogd worden door het aanbieden van een HPV-zelftest aan niet-gescreende vrouwen tussen 30 en 64 jaar.

**Methode:** Dit onderzoek vond plaats in een duo-huisartspraktijk in Gent. Er werd over een periode van 5 maanden aan elke vrouw tussen de 30 en 64 jaar, die een arts consulteerde gevraagd hoe de baarmoederhalsscreening liep. Indien zij de afgelopen 3 jaar geen baarmoederhalsuitstrijkje hebben laten afnemen konden zij kiezen om niet gescreend te worden, een klassiek baarmoederhalsuitstrijkje te laten afnemen of de HPV-zelftest te gebruiken.

**Resultaten:** 31 bevraagde vrouwen waren in dit onderzoek niet gescreend (31% van de bevraagde populatie). 30 (97%) van deze vrouwen kozen ervoor om de HPV-zelftest te gebruiken ( 10 vrouwen namen deze test in de praktijk af, 20 vrouwen namen deze test mee naar huis). 1 vrouw koos ervoor geen screening naar baarmoederhalskanker te doen.

**Conclusie:** Uit dit onderzoek kunnen we, met voorzichtigheid, concluderen dat het aanbieden van de HPV-zelftest door de huisarts de participatiegraad bij de niet-gescreende vrouwen sterk verhoogt. De direct aansprekende rol van de huisarts blijkt hier van cruciaal belang te zijn.