Medicinale cannabis in België

Haio: BAGEART Diewke , KUL
Promotor: VANKRUNKELSVEN Patrik , KUL
Praktijkopleider: SABBE Eveline , VANHEE Patrick

Context: Medicinale cannabis in België is op heden nog niet legaal, behalve bij patiënten met multiple sclerose, waarbij het gaat over de behandeling van therapie-resistente spasticiteit met Sativex®. Voor alle andere mogelijke indicaties is er geen goedkeuring van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG). Toch neemt de vraag naar medicinale cannabis toe.

Onderzoeksvraag: Wat is het profiel van de Belgische patiënt die een hulpvraag stelt naar medicinale cannabis?

Methode: Via de organisatie MEDCAN, een zelfverklaard expertisecentrum voor medicinale cannabis, werden de data van alle intakegesprekken en de bijgevoegde medische verslagen van 2017 verwerkt. Daarbij werden er zowel demografische gegevens geregistreerd als ook de medische indicatie waarvoor de hulpvraag gesteld werd.

Resultaten: In 2017 meldden 317 patiënten zich aan bij MEDCAN met een hulpvraag naar medicinale cannabis. De belangrijkste leeftijdscategorie (66%) waren patiënten tussen 34 en 65 jaar. Er waren meer vrouwen (59%) dan mannen met een hulpvraag naar medicinale cannabis. Het leeftijdsprofiel van de Belgische medicinale cannabisgebruiker komt niet overeen met het profiel van een recreatieve cannabisgebruiker. Qua arbeidssituatie had een minderheid van de 18- tot 65-jarigen een voltijdse job (27%). Eenentwintig percent van de patiënten zijn niet in staat dagdagelijkse handelingen zelfstandig uit te voeren en 35% voelt zich sociaal geïsoleerd door hun aandoening. De drie meest voorkomende medische indicaties zijn chronische pijn (31%), waarvan de helft een rug-gerelateerde problematiek heeft, het chronisch vermoeidheidssyndroom/fibromyalgie (23%) en kanker (15%), met voornamelijk kanker gerelateerde pijn en nausea als reden voor gebruik.

Conclusie: De Belgische patiënt die een hulpvraag stelt naar medicinale cannabis is voornamelijk vrouwelijk, tussen 34 en 65 jaar en doet dit meestal omwille van pijnproblematiek.