Optimalisatie van het SOA-consult: analyse op niveau van de arts en tool voor de patiënt Focus: patiënt

Haio: BARTELS Evelien , KUL
Promotor: SCHOENMAKERS Birgitte , KUL
Praktijkopleider: WEYMANS Jean Marie

Context: Artsen ervaren verschillende drempels bij het bevragen van het seksueel risicogedrag van hun patiënten. Bovendien zijn patiënten zich niet altijd bewust van hun risicogedrag en is hun kennis over soa's beperkt. Het doel van deze studie is om na te gaan of een online tool, louter gericht op het begeleiden en verwijzen van de gebruiker, het soa-consult kan verbeteren door in te spelen op de hierboven genoemde drempels.

Onderzoeksvraag: Kan een online beslishulp, gericht aan de patiënt, bijdragen aan een betere soa-screening?

Methode: Een bestaande online tool over soa-screening gericht aan de huisarts wordt aangepast tot een beslishulp gericht aan de patiënt. Deze tool wordt verspreid via facebook en instagram en eveneens via een affiche in wachtzalen van 2 huisartsenpraktijken. De beslishulp wordt geëvalueerd op basis van een enquête, die wordt aangeboden aan de gebruikers na het invullen van de tool.

Resultaten: De tool werd door 35 gebruikers via een enquête beoordeeld. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 28,54 jaar. De meeste gebruikers vonden hun weg naar de tool via facebook en alle gebruikers gaven aan dat de tool gemakkelijk te doorlopen was. Na het invullen van de tool waren er minder gebruikers zeker dat ze geen soa zouden hebben en waren er meer gebruikers van plan om een arts hierover te consulteren dan voor het gebruik van de tool. Alle patiënten die hun huisarts gingen bezoeken, waren ook van plan hun resultaten met hem te delen.

Conclusie: Deze studie doet vermoeden dat er plaats is voor een online tool over soa-screening gericht aan patiënten en dat deze tool ook kan bijdragen aan een vlottere soa-consultatie. Bovendien kan een dergelijke beslishulp ook inspelen op de beperkte kennis en helpen bij de bewustwording van de patiënt door het online aanbieden van de tool. Toch dient er rekening te worden gehouden met een mogelijke selectiebias en de kleinschaligheid van dit onderzoek.