GEBRUIK EN KENNIS VAN MIDDELEN TEGEN PIJN, KOORTS EN ONTSTEKING BIJ

Haio: VANDENSTEEN Karen , KUL
Promotor: CHRISTIAENS Thierry , U.G.
Praktijkopleider: Deprost Luc , WILLEMS Jozef

Context: Analgetica worden frequent gebruikt zonder advies van de huisarts. Wij stellen ons de vraag in welke mate patiënten deze medicatie juist gebruiken en hoe goed ze deze farmaca kennen.

Onderzoeksvraag: Met deze studie willen we de kennis en het gebruik van pijnstillers bij volwassenen en kinderen nagaan en risicogroepen identificeren in de huisartspraktijk. Twee deelstudies werden uitgevoerd: Tineke Van Kerschaver bestudeerde de volwassenen en hun gebruik en kennis, ikzelf bestudeerde het gebruik bij kinderen jonger dan 10 jaar. De kennis van de ouders werd in kaart gebracht.

Methode: De literatuur over analgeticagebruik bij kinderen werd geraadpleegd aan de hand van volgende MeSH-termen: nonprescription drugs; health knowledge, attitudes, practice; antipyretics or analgesics or analgesics, non-narcotic; child or child, preschool or infant or infant, newborn. Daarenboven werden verschillende artikels verkregen via snowballing Enqu?tes werden na de consultatie met de patiënten meegegeven tussen 1 mei en 31 augustus 2011. Er werden twee soorten enqu?tes verspreid: ??n die handelde over het gebruik van analgetica van de volwassen patiënt zelf en ??n over het gebruik bij kinderen jonger dan 10 jaar. Nadien werden de gegevens verwerkt met SPSS 19.

Resultaten: Van de 28 ouders vond 57,1% het belangrijk een koortswerend middel te geven vanaf 38?C. Ouders wisselden zeer vaak twee producten af. Slechts 59.1% van de ouders die paracetamolsiroop gaven, gaf die volgens gewicht. Ibuprofensiroop werd bij 76.2% volgens gewicht gegeven. De globale kennis van ouders over nevenwerkingen, contra-indicaties en overdosering van analgetica was beperkt. De belangrijkste informatiebronnen waren de arts, de apotheker en de bijsluiter.

Conclusie: Uit de studie is naar voren gekomen dat patiënten een beperkte kennis over analgetica hebben. Patiënten met een opname in het laatste jaar en ouders van jonge kinderen vormen een risicogroep voor oneigenlijk gebruik van pijnstillers.