Evaluatie van de zorg voor allochtone diabetespatiënten in een huisartsenpraktijk in Brussel.

Haio: CAYDASI Ufuk , V.U.B.
Promotor: DEVROEY Dirk , V.U.B.
Praktijkopleider: METS - GERIATRIE Tony , POYRAZ Gülsüm , VELKENIERS Brigitte

Context: Desondanks de consensus over de follow-up van Diabetes Type 2 patiënten in de algemene bevolking zijn er weinig gegevens bekend over de aanpak van diabetes bij allochtoon met diabetes in de huisartsenpraktijk in een grootstedelijk gebied.

Onderzoeksvraag: Nagaan in hoeverre de aanbevolen doelstellingen bij follow-up van Diabetes Type 2 behaald worden in een subgroep van allochtone patiënten (patiënten van Turkse afkomst) bij een huisartsenpraktijk (HAP) in Brussel. Deze resultaten vergelijken met met een autochtone populatie (Het Diabetes Project (DP) Leuven)

Methode: Retrospectief onderzoek van de dossiers van diabetespatiënten met betrekking tot het kalenderjaar 2011. De primaire maat is een samengesteld eindpunt op het niveau van de patiënt: het aantal bereikte doelstellingen dat een patiënt behaalt (3, 2, 1 of nul) door het aggregeren van volgende doelstellingen: HbA1c < 7%, LDL-C < 100 mg/dl en Systolische Bloeddruk

Resultaten: Primaire maat HAP Brussel vs DP Leuven respectievelijk : 10 % vs 13% (NS) van de patiënten behaalt alle drie de doelstellingen, 31% vs 34% (NS) behaalt 2 van de 3 doelstellingen, 39% vs 39 % (NS) behaalt 1 doelstelling, 20% vs14% ($p<0,05$) behaalt geen enkele doelstelling. Secundaire maat HAP Brussel vs DP Leuven respectievelijk: 36% vs 54% ($p<0,001$) heeft een HbA1c < 7%, 48% vs 50% (NS) van de patiënten heeft een SBD

Conclusie: Deze studie bewijst dat allochtone diabetespopulatie minder doelstelling behaalt dan autochtone patiënten vooral wat betreft levenstijl. Diabetische zorg bij allochtone patiënten kan specifieke interventies eisen om hun diabetesgebonden levensstijl te veranderen. Verder onderzoek zal de methoden van interventies verder moeten verfijnen en de behoeften van deze subgroep nader defini?ren.