Communicatie tussen kinesist en huisarts: nagaan van de validiteit en betrouwbaarheid van een vragenlijst over het kinesitherapeutisch verslag

Haio: DOMINICUS Elisa , U.G.
Promotor: Schrans Diego , U.G.
Praktijkopleider: CLARYSSE Stéphanie , DE BO Thomas , DELVA Hans , DEPOOT Isabelle , MONSIEUR Gielke , RIMBAUT Elke , TIMMERMANS Teresa

Context: Het bekomen van een betrouwbare en gevalideerde vragenlijst is belangrijk zodat deze in toekomstig onderzoek kan gebruikt worden als instrument om de communicatie tussen huisarts en kinesist te evalueren en op basis hiervan aanbevelingen te kunnen doen.

Onderzoeksvraag: Het opzet van deze studie is het opstellen van een betrouwbare en gevalideerde vragenlijst voor kinesisten betreffende de communicatie tussen huisarts en kinesist.

Methode: Vooreerst werd een oriënterend literatuuronderzoek gedaan om aan de hand van deze resultaten een eerste vragenlijst op te stellen. In FASE I werd er een validiteitsstudie uitgevoerd aan de hand van een focusgroep experten. Er werden 3 rondes georganiseerd met 5 experten. In FASE II werd een test-hertest betrouwbaarheidsstudie uitgevoerd. Deelnemende kinesisten werden gerecruteerd via beroepsvereniging Axxon. In totaal bekwamen we een steekproef van 23 kinesisten. Er werd gevraagd de vragenlijst twee maal in te vullen met een tussentijd van 1 week. De vragenlijst werd opgesteld in en doorgestuurd via de online software REDCap. Statistische analyse gebeurde aan de hand van de intraclass correlatiecoëfficiënt (type two-way mixed, absolute agreement, single measure), standard error of measurement en de Cohen's Kappa-coëfficiënt. Er werd tevens een gepaarde Wilcoxon test uitgevoerd.

Resultaten: Onze betrouwbaarheidsstudie kon aantonen dat 68,5% van de vragen uit de opgestelde vragenlijst een gemiddelde tot goede betrouwbaarheid hebben. Bij 19,5% van de vragen werd aanbevolen kleine aanpassingen te doen om de betrouwbaarheid te vergroten. 12% van de vragen scoorden slecht op betrouwbaarheid.

Conclusie: Onze betrouwbaarheidsstudie toont aan dat 68,5% van de vragen uit de opgestelde vragenlijst een gemiddelde tot goede betrouwbaarheid had, bijgevolg kunnen deze gebruikt worden in toekomstig onderzoek. Daarnaast werd bij 19,5% van de vragen aanbevolen om kleine aanpassingen te doen aan de vragen om zo de betrouwbaarheid te vergroten. We kunnen aldus concluderen dat met 88% van de vragen die worden aanbevolen te gebruiken in toekomstig onderzoek, de resultaten van ons onderzoek gunstig zijn. In toekomstig onderzoek zou onze vragenlijst moeten worden gefinetuned en tenslotte worden gepiloteerd in een grote groep kinesitherapeuten. Op deze manier kunnen er vitale parameters worden geidentificeerd om de communicatie tussen huisarts en kinesitherapeut te bevorderen.