# Urgentieschema's voor huisartesen: BLS en AED "Basic Life Support (BLS) en gebruik van Automatic External Defibrillator (AED)"

**Haio:** KENIS Sasha , KUL
**Promotor:** AERTGEERTS Bert , KUL
**Praktijkopleider:** BUYSSCHAERT Joke , VANBELLEGHEM Vincent , VANDELOO Kara , VOET Elia

**Context:** Plotse hartdood is de derde meest voorkomende doodsoorzaak in België. Een aandeel hiervan deze betreft de out-of-hospital cardiac arrests (OHCA). Tijdige opstart van CPR is cruciaal. Huisartsen kunnen als eerstelijnshulpverleners ook in contact komen met een OHCA. Een goede kennis en vaardigheid van de huidig richtlijnen is cruciaal om optimale zorg te kunnen bieden.

**Onderzoeksvraag:** Hoe moet men handelen als huisarts indien men geconfronteerd wordt met een OHCA?

**Methode:** Aan de hand van een literatuuronderzoek op PubMed en Cochrane werd gezocht naar the standard of care bij een OHCA, deze informatie werd nadien getoetst in de praktijk a.d.h.v. enkele lokale kwaliteitsgroepen (LOK) en interviews met experten.

**Resultaten:** In totaal werden 261 artikels gevonden waarvan we 5 weerhielden voor de BestBET.

**Conclusie:** Als huisarts volgt men best de richtlijn van het ERC in het Europees grondgebied in geval van een OHCA, verder werden praktische adviezen bijgevoegd om tot een urgentieschema te komen.