vaccinatie

Haio: VANDEPUTTE Lucy , V.U.B.
Promotor: DEVROEY Dirk , V.U.B.
Praktijkopleider: Broeckaert Ophélie , Van Haver Katrin

Context: Vaccine-hesitancy is een fenomeen die doorheen de jaren meer een meer aan bod komt. Om de vier jaar is er een studie van Zorg en Gezondheid die de vaccinatiegraad in België nagaat. Hieruit blijkt dat de vaccina-tiegraad doorheen de jaren wel lichtjes blijft stijgen in België. Zowel bij kleine kinderen als bij adolescenten als bij volwassenen. Uit een wereldwijd onderzoek naar het vertrouwen in wetenschap en vaccins in 2018 bleek wel dat in België 21% van volwassenen vaccins als niet veilig zien. Met de huidige wereldwijde pan-demie van SARS-CoV-2 (COVID-19) lijkt vaccinatie en de betrouwbaarheid ervan meer dan ooit een hot topic. De laatste bevraging van Zorg en Gezondheid dateert uit 2016 en gezien de huidige ontwikkelingen leek het interessant om het deel van de vragenlijst van Zorg en Gezondheid over vaccine-hesitancy eens te bevragen bij onze populatie patiënten in de praktijk. Alsook te toetsen naar de bereidheid om zich voor SARS-CoV-2 te laten vaccineren.

Onderzoeksvraag: WAT IS DE HOUDING TEGENOVER VACCINS IN ONZE PRAKTIJK (DEN BLINK, VILVOORDE)?

Methode: Men ging tewerk door middel van een papieren vragenlijst die beschikbaar was voor patiënt in de multicul-turele huisartsenpraktijk Den Blink in Vilvoorde. In de vragenlijst bevragen we de demografische gegevens maken we aantal stellingen met betrekking tot vaccinatie en gezondheid en de bezorgdheden daarover. Voor de stellingen maken we gebruik van een 5-punts Likert schaal. Vervolgens peilen we met de vragen-lijst naar de bereidheid om te vaccineren en eindigen we met een facultatieve vraag over de redenen waarom patiënten zich eventueel niet willen laten vaccineren (meerdere antwoorden mogelijk).

Resultaten: Er werden 62 vragenlijsten volledig ingevuld en de verzamelde data werden vergeleken in kruis- en fre-quentietabellen door middel van univariate analyses.1 op 5 deelnemers twijfelt aan de veiligheid van vac-cins en 2 op 5 deelnemers heeft zelfs schrik voor ernstige bijwerkingen van vaccins. Toch volgen 9 op de 10 deelnemers het advies op van hun arts met betrekking tot vaccinatie. Minder dan 1 op 10 deelnemers geeft aan het COVID-19 vaccin te weigeren maar meer deelnemers duidden bezorgheden aan omtrent COVID-19 vaccins. De grootste zorg zijnde angst voor bijwerkingen op lang termijn, kort opgevolgd door angst voor bijwerkingen op kort termijn. De invloed van de vaccins op fertiliteit en de snelheid waaraan het vaccin werden ontwikkeld bleken ook een bron van zorg te zijn. Alsook, in mindere mate, de aanwezige hulpstoffen in de vaccins.

Conclusie: De patiëntenpopulatie in Den Blink kampt met dezelfde vragen en twijfels als de rest van de wereld. Hoe-wel dit onderzoek zijn beperkingen had doordat het enkel beschikbaar was in het Nederlands en doordat de vraagstelling van de laatste vraag er misschien voor gezorgd heeft dat minder mensen hun bezorgdheden hebben gedeeld. Blijkt 9 op de 10 deelnemers toch het advies te volgen van zijn of haar arts. De cijfers voor de praktijk komen overeen met de cijfers in de literatuur en dit zowel voor België als wereldwijd. Gezien dit ook een pijnpunt is dat het WHO graag zou willen aanpakken binnen de geneeskunde, lijkt het nuttig om zich als arts persoonlijk verder te verdiepen in de kennis over vaccins, maar ook in onze communicatieve skills om dit te bespreken met patiënten. Paternalisme is een ouderwetse aanpak van geneeskunde en zou plaats moeten maken voor dialoog.