De attitudes en barrières bij huisartsen in de vroegtijdige detectie van dementie – een systematische review

Haio: MONTAGNA Carlo , KUL
Promotor: VERBAKEL Jan , KUL
Praktijkopleider: Beinsberger Hanne , Jans Vera , TEUWEN Jo , VAES Griet , Van Den Bossche Luc , WYNANTS Stefan

Context: Dementie wordt gedefinieerd als een beperking van verschillende cognitieve functies die een impact hebben op het dagelijks functioneren van de patiënt. Wereldwijd zijn er ongeveer 55 miljoen mensen met dementie. De vroegtijdige detectie van dementie kan vele voordelen geven en wordt gezien als één van de pijlers in de wereldwijde actieplannen. Ondanks dat het stellen van een vroegtijdige diagnose belangrijk is, tonen verschillende studies dat er een lange periode zit tussen het optreden van de symptomen van dementie en het stellen van de diagnose.

Onderzoeksvraag: Welke barrières en attitudes van huisartsen hebben een impact op de vroegtijdige detectie van dementie bij oudere patiënten (>65jaar) in de eerstelijnszorg?

Methode: Het doel van deze studie is door middel van een systematische review na te gaan welke barrières en attitudes een rol spelen bij huisartsen voor het vroegtijdig detecteren van dementie in de eerstelijnszorg. Drie elektronische databanken (PUBMED, EMBASE en Web of Science) werden op 7 maart 2021 geraadpleegd. Een thematische analyse werd gebruikt om de data te presenteren.

Resultaten: In deze literatuurstudie werden 34 artikels geïncludeerd, deze studies omvatten de mening van 10810 huisartsen rond de vroegtijdige diagnose van dementie. Zeven mogelijke barrières werden hierbij geïdentificeerd: tijd, screeningstools, kennis en training, taal en cultuur, organisatie van de zorg, attitude van de patiënt of de familie en attitude van de huisarts zelf.

Conclusie: Huisartsen zien de vroegtijdige diagnose van dementie als zinvol en positief voor zowel de patiënt als de familie. Echter, het diagnostisch proces is complex. Zeven thema’s worden in deze systematische review besproken als mogelijke barrières voor huisartsen bij de vroegtijdige diagnose van dementie. Het aanpakken van deze barrières kan leiden tot een betere vroegtijdige detectie van dementie in de eerstelijnszorg.