Hulpzoekgedrag bij huiselijk geweld tijdens de COVID-19 pandemie

Haio: COX Ilse , KUL
Promotor: KEYGNAERT Ines , U.G.
Praktijkopleider: Balligand Elie , REYSKENS Miet , SCHELLEMANS Michel , VAN ASCH Yves

Context: Tijdens de COVID-19 pandemie en de bijhorende isolatiemaatregelen werd een toename van huiselijk geweld geobserveerd. Slachtoffer of getuige worden van fysiek, psychisch en seksueel geweld kent belangrijke negatieve gevolgen op korte en lange termijn. Het zoeken naar professionele hulp is essentieel om deze negatieve gevolgen te beperken.

Onderzoeksvraag: Wat zijn de voorspellende factoren voor hulpzoekgedrag bij huiselijk geweld?

Methode: De dataset van de studie ‘Onderzoek naar relaties, stress en agressie (RSA) in de eerste 12 maanden van COVID-19 in België’ werd gebruikt, dit betrof een vragenlijst die werd ingevuld van januari tot mei 2021. Participanten die een event van huiselijk geweld doormaakten tijdens de tweede golf van COVID-19 werden geselecteerd (n=680). Personen die hulp zochten (n=188) werden vergeleken met participanten die dit niet deden (n=492) aan de hand van sociodemografische en mentale gezondheidsfactoren. Zowel chi-kwadraattoetsen als logistische regressies werden uitgevoerd.

Resultaten: Een lager huishoudelijk inkomen was een voorspellende factor voor het zoeken van professionele hulp (OR=1,5; BI: 0,504-0,932). Andere voorspellende factoren waren het gebruik van slaap- en kalmeermiddelen tijdens de tweede golf (OR=2,6; BI: 1,463-4,594) en de aanwezigheid van drie of meer acute stress symptomen tijdens de tweede golf (OR=2,0; BI: 1,280-3,033).

Conclusie: In deze retrospectieve studie waren het gebruik van slaap- en kalmeermiddelen en de aanwezigheid van drie of meer acute stress symptomen de sterkste voorspellende factoren voor het zoeken van professionele hulp bij huiselijk geweld. De huisarts dient hier dus extra bedacht op te zijn.