Hulpzoekgedrag bij huiselijk geweld tijdens de COVID-19 pandemie

Haio: LUTZ Isabelle , KUL
Promotor: KEYGNAERT Ines , U.G.
Praktijkopleider: Fonteyn Olivier , FRANSEN Raf , WEERTS An Marie-Rose

Context: Tijdens de COVID-19 pandemie en de bijhorende isolatiemaatregelen werd een toename van huiselijk geweld geobserveerd. Slachtoffer of getuige worden van fysiek, psychologisch en seksueel geweld kent belangrijke negatieve gevolgen op korte- en lange termijn. Het zoeken naar professionele hulp is essentieel om deze negatieve gevolgen te beperken.

Onderzoeksvraag: Wat zijn de voorspellende factoren voor hulpzoekgedrag bij huiselijk geweld?

Methode: De dataset van de studie ‘Onderzoek naar relaties, stress en agressie (RSA) in de eerste 12 maanden van COVID-19 in België’ werd gebruikt, dit betrof een vragenlijst die werd ingevuld van januari tot mei 2021. Participanten die een event van huiselijk geweld doormaakten tijdens de tweede golf van COVID-19 werden geselecteerd (n=680). Personen die hulp zochten (n=188) werden vergeleken met participanten die dit niet deden (n=492) aan de hand van sociodemografische en mentale gezondheidsfactoren. Zowel chi-kwadraattoetsen als logistische regressies werden uitgevoerd.

Resultaten: Een lager huishoudelijk inkomen was een voorspellende factor voor het zoeken van professionele hulp (OR=1,5; BI: 0,504-0,932). Andere voorspellende factoren waren het gebruik van slaap- en kalmeermiddelen tijdens de tweede golf (OR=2,6; BI: 1,463-4,594) en de aanwezigheid van een acute stressstoornis tijdens de tweede golf (OR=2,0; BI: 1,280-3,033).

Conclusie: In deze retrospectieve studie waren het gebruik van slaap- en kalmeermiddelen en de aanwezigheid van acute stressstoornis de sterkste voorspellende factoren voor het zoeken van professionele hulp bij huiselijk geweld. De huisarts dient hier dus extra bedacht op te zijn.