Arbeidsongeschiktheid na cholecystectomie: Huidige praktijk van huisarts en chirurg en vergelijking met internationale standaarden.

Haio: DANIELS Adriaan , V.U.B.
Promotor: GODDERIS Lode , KUL
Praktijkopleider: HUYGENS Fanny , Smets Jos

Context: Een cholecystectomie is een frequent uitgevoerde ingreep. Gezien de meeste patiënten nog beroepsactief zijn, gaat dit gepaard met een belangrijke arbeidsongeschiktheid. Binnen de heelkunde is er een toenemende focus op minimaal invasieve procedures en sneller herstel na ingrepen. In hoeverre zich dit vertaalt naar de arbeidsongeschiktheid is echter nog onduidelijk.

Onderzoeksvraag: Dit onderzoek wenst de voorgeschreven arbeidsongeschiktheid bij Vlaamse chirurgen en huisartsen in kaart te brengen en deze aftoetsen t.o.v. een aantal internationale standaarden

Methode: Een enquête werd verdeeld onder de Vlaamse huisartsen en chirurgen om te polsen naar hun voorschrijfgedrag en motivatie voor arbeidsongeschiktheid na een ongecompliceerde cholecystectomie.

Resultaten: 63 enquêtes konden geïncludeerd worden. De zwaarte van arbeid alsook de gekozen operatietechniek bepalen de gekozen duur van de arbeidsongeschiktheid. De graad van urgentie, de leeftijd van de arts of de specialiteit van de voorschrijver, bleken geen significant effect te hebben op de voorgeschreven arbeidsongeschiktheid. Keuzes werden door de meeste artsen (79%) gebaseerd op persoonlijke ervaring en lokale gewoontes en liggen in de meeste situaties 1 tot 4 dagen hoger als wat de internationale richtlijnen voorschrijven.

Conclusie: Vlaamse artsen schrijven meer arbeidsongeschiktheid voor dan teruggevonden in internationale richtlijnen. Ze weerhouden wel dezelfde parameters: de fysieke zwaarte van de arbeid en de operatietechniek. De richtlijnen worden ook nauwelijks gebruikt. Uitwerking van Vlaamse/Belgische richtlijnen lijkt nuttig en noodzakelijk.