Seksualiteit na brandwonden: een kwantitatief onderzoek

Haio: LYSSENS-DANNEBOOM Lauranne , U.A.
Promotor: VANSINTEJAN Johan , V.U.B.
Praktijkopleider: LEENDERS Tim , Lyssens Guy , VAN CLEEMPUT Marc , VAN MELKEBEEK Jan , VLEUGELS Werner

Context: De geneeskunde heeft zich zo geëvolueerd dat de mortaliteit na brandwonden sterk is afgenomen. Hierdoor is er tijdens de rehabilitatie meer en meer aandacht voor levenskwaliteit. Seksualiteit maakt hier een essentieel onderdeel van uit.

Onderzoeksvraag: Het doel van deze studie was om de impact van brandwonden op seksualiteitsbeleving na te gaan. Er werd onderzocht of dezelfde verbanden werden gevonden tussen voorspellende factoren aangereikt door de literatuur of eventueel nieuwe verbanden konden worden gelegd. Deze studie droeg verder bij aan het doorbreken van de taboe in de hoop dat zowel zorgverleners als patiënten zich in de toekomst comfortabel genoeg kunnen voelen om dit onderwerp te bespreken.

Methode: Op basis van de literatuur gevonden via PUBMED en EMBASE-databanken werden factoren die een invloed kunnen hebben op seksualiteitsbeleving na brandwonden geïdentificeerd en opgelijst. Er werd vervolgens een anonieme vragenlijst over seksualiteitsbeleving na brandwonden opgesteld. Deze werd in Qualtrics beschikbaar gesteld van september 2023 tot februari 2024. Rekrutering gebeurde via Facebook, via nazorg- en onderzoekscentrum Oscare (Merksem) en via drie Vlaamse brandwondencentra (Leuven, Antwerpen, Brussel). De data werden geanalyseerd door middel van beschrijvende statistiek en via lineaire regressie werd getest of seksualiteitsbeleving werd beïnvloed door locatie of ernst van verbranding.

Resultaten: De vragenlijst werd beantwoord door 26 deelnemers, waarvan slechts acht personen de vragenlijst volledig invulden. Er kon geen significant effect gevonden worden van ernst van verbranding op seksualiteitsbeleving. Verder leek er in de steekproef vooral een negatief effect van verbranding op de romp en geslachtsdelen op seksualiteitsbeleving, maar ook dit was statistisch niet significant. De belangrijkste beperking van deze studie was de zeer beperkte steekproef waardoor het moeilijk was om met deze studie verheldering te geven over determinanten die een rol spelen bij seksualiteitsbeleving na brandwonden.

Conclusie: Ondanks het ontbreken van statistisch significante resultaten, benadrukt deze studie het belang van verder onderzoek in de hoop dat dieper inzicht kan leiden tot meer educatie van zowel zorgverleners als patiënten en de drempel wordt verlaagd om seksualiteit te bespreken in de nazorg van brandwonden.