Seksualiteitsbeleving bij psoriasispatiënten

Haio: WILLEMYNS Robin , KUL
Promotor: VANSINTEJAN Johan , V.U.B.
Praktijkopleider: HENCKAERTS Liesbet , PEETERMANS Willy , Van Mechelen Wouter , VANSINTEJAN Johan

Context: Psoriasis, een veelvoorkomende chronische huidaandoening, heeft verstrekkende gevolgen die verder reiken dan de zichtbare symptomen, waaronder de invloed op seksuele functies. Echter, onderzoek naar dit aspect blijft beperkt, met name in België. Deze studie heeft als doel om deze lacune te vullen door de factoren te onderzoeken die bijdragen aan seksuele disfunctie bij psoriasispatiënten in Vlaanderen.

Onderzoeksvraag: Hoe beïnvloeden bepaalde patiëntspecifieke en ziektespecifieke factoren de seksuele functie bij patiënten met psoriasis?

Methode: Met behulp van een cross-sectioneel ontwerp werden gegevens verzameld via een anonieme online enquête, verspreid via psoriasispatiënten ondersteunende groepen en huisartsenpraktijken, resulterend in reacties van 83 deelnemers.

Resultaten: De resultaten toonden een opmerkelijke prevalentie van seksuele disfunctie, waarbij 91,6% melding maakte van enige impact van psoriasis op seksuele functies. Analyse van factoren zoals geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, tijd sinds de diagnose en lokalisatie van laesies leverde genuanceerde inzichten op in hun invloed op seksuele functies en lichaamsbeeld. Belangrijke bevindingen omvatten lagere scores voor lichaamsbeeld en verlangen bij vrouwen vergeleken met mannen, en een significante invloed van laesies van psoriasis op het gezicht op seksuele functies. Bovendien vertoonden heteroseksuele mannen lagere scores voor seksuele functies vergeleken met homoseksuele mannen.

Conclusie: Deze resultaten benadrukken de complexiteit van seksuele gezondheid bij psoriasispatiënten en onderstrepen de noodzaak van op maat gemaakte interventies. Sterke punten van de studie zijn onder andere de uitgebreide verkenning van aspecten van seksuele functies en een grote steekproefomvang, waardoor statistisch significante bevindingen mogelijk waren. Beperkingen zijn onder meer het vertrouwen op een op maat gemaakte vragenlijst, wat directe vergelijkingen met eerder onderzoek beperkt, en mogelijk vrijwilligersbias. Tot slot bevestigt deze studie het significante effect van psoriasis op seksuele functies en benadrukt het belang van voortdurende screening en samenwerking tussen dermatologen en huisartsen. Toekomstig onderzoek zou verder kunnen verduidelijken welke patiënt- en ziekte-specifieke factoren van invloed zijn op de seksuele gezondheid bij psoriasispatiënten, om zo meer gerichte interventies te informeren die de welzijn van de patiënt bevorderen.