Verwachtingen van patiënten omtrent antibiotica-voorschriften van de huisarts

Haio: De Ceuster Inne , V.U.B.
Promotor: VANSINTEJAN Johan , V.U.B.
Praktijkopleider: LAMBERTS JAN , MARCELIS Johan , VAN PAESSCHEN Wim , VRIJDAG Marc

Context: Wereldwijd toenemende antimicrobiële resistentie door o.a. overmatig antibioticagebruik heeft een belangrijke mortaliteit tot gevolg. Door een beperkte kennis verwachten patiënten (te) vaak antibiotica, wat het voorschrijfgedrag van artsen beïnvloedt; ook in België schrijft men te vaak antibiotica voor (vooral bij luchtweginfecties/oorontstekingen). Echter is er amper onderzoek gedaan naar de verwachtingen van Belgische patiënten omtrent antibiotica.

Onderzoeksvraag: Dit onderzoek tracht meer inzicht te krijgen in de verwachtingen van Belgische patiënten betreffende het antibiotica-voorschrift door huisartsen en welke ICE hier een rol in spelen, en tracht ook deze verwachtingen te toetsen aan de BAPCOC-richtlijnen om zo gaps te identificeren.

Methode: De resultaten van dit semi-kwantitatief cross-sectioneel onderzoek zijn verzameld a.d.h.v. enquêtes bij patiënten en geanalyseerd met behulp van IBM SPSS Statisctics (beschrijvende en vergelijkende statistiek).

Resultaten: Er werden 130 geldige enquêtes verzameld. Ziektebeelden keelpijn, oorpijn en oogontsteking toonden de hoogste percentages aan verwachtingen naar wél antibiotica, en bij deze ziektebeelden werden ook de belangrijkste gaps tussen patiëntenverwachtingen en de BAPCOC-richtlijnen gevonden. De bezorgdheid dat “de ziekte zal verergeren of dat complicaties optreden” was de belangrijkste ICE wanneer men wel antibiotica verwachtte. De demografische variabele waarbij de meeste correlatie met hogere verwachtingen naar antibiotica werd aangetoond, was “afkomst van buiten de EU”.

Conclusie: Er zijn dus zeker nog gaps tussen de verwachtingen van de Belgische patiënt naar antibiotica-voorschriften en de richtlijnen van de BAPCOC te identificeren. Verwachtingen zijn zowel gelinkt aan bepaalde ziektebeelden (met relatief hoge verwachtingen naar antibiotica bij keelpijn, oorpijn/oorontsteking en oogontsteking), als aan specifieke klachten en de graad van ernst. De bezorgdheid dat de ziekte zal verergeren of dat complicaties zullen optreden is de voornaamste ICE en wijst op een belangrijke rol voor uitleg/patiënten-educatie en het bespreken van alarm-symptomen als mogelijke target voor interventie.