Het implementeren van een nieuwe chlamydia point of care test in de huisartsenpraktijk

Haio: Hoeylaerts Laura , V.U.B.
Promotor: VAN DEN BRUEL Ann , KUL
Praktijkopleider: Beutels Michel , DE BECKER Nicole , DE ROMAGNOLI Guido , LAMBRECHT Sophie , VERHAEVERBEKE Ilse , Zhang Li

Context: Chlamydia is de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoening (soa) in België. Deze soa kan belangrijke complicaties met zich meebrengen. Er zijn sneltesten voor chlamydia in ontwikkeling voor gebruik in zowel ambulante als klinische setting.

Onderzoeksvraag: Het doel van dit onderzoek is om de patiëntvoorkeuren voor de ontwikkeling van chlamydia-sneltesten in de huisartsenpraktijk bij vrouwen tussen de 18 en 35 jaar in kaart te brengen.

Methode: Bij jonge vrouwen (18-35 jaar) werd in een Antwerpse huisartsenpraktijk een online vragenlijst afgenomen (n=7), die vervolgens werd geanalyseerd met behulp van beschrijvende statistiek.

Resultaten: Deelnemers stonden open voor zowel thuisafname als afname door de huisarts. Meerdere instructieopties werden geschikt bevonden, mits betrokkenheid van de huisarts. De sneltest zou goedkoop (mediaan 10 euro) en snel (resultaat binnen één dag) moeten zijn. Voor het meedelen van testresultaten werden meerdere opties geschikt bevonden waarbij ook de huisarts betrokken moet blijven, met een voorkeur voor telefonisch contact door de huisarts, gevolgd door online communicatiekanalen.

Conclusie: Deze bevindingen wijzen op het belang van een flexibele, patiëntgerichte en laagdrempelige aanpak bij de implementatie van chlamydia-sneltesten in de huisartsenpraktijk. Hierbij spelen de betaalbaarheid van de test, de snelheid van resultaat en de betrokkenheid van de huisarts, zowel bij instructie als bij de bekendmaking van resultaten, een centrale rol.