psychofarmarca gebruik correctionele instelling

Haio: Wens Niels , KUL
Promotor: AERTGEERTS Bert , KUL
Praktijkopleider: MATTHYSSEN Philip , Peeters Mieke , VAN GIEL Roel

Context: Achtergrond: Psychische stoornissen komen disproportioneel vaak voor bij gedetineerden, wat resulteert in een verhoogd psychofarmacagebruik. Deze systematische review onderzocht de prevalentie en variabiliteit van psychofarmacagebruik binnen internationale gevangenissen.

Onderzoeksvraag: Wat is het actueel voorschrijfgedrag op vlak van psychofarmaca binnen internationale gevangenissen, met specifieke aandacht voor anxiolytica/hypnotica, antidepressiva en antipsychotica.

Methode: Via een gestructureerde literatuurzoektocht in PubMed, Embase, Web of Science en CINAHL werden 21 studies geselecteerd die rapporteerden over het gebruik van anxiolytica/hypnotica, antidepressiva en antipsychotica bij volwassen gedetineerden. Gegevens werden geanalyseerd met behulp van gewogen gemiddelden en betrouwbaarheidsintervallen.

Resultaten: Bij een totale steekproef van 36.595 gedetineerden gebruikte gemiddeld 31,6% psychofarmaca. Vrouwen gebruikten significant vaker psychofarmaca dan mannen (48,8% vs. 26,5%). Het gebruik van antidepressiva bedroeg gemiddeld 18,7%, antipsychotica 12,7%, en anxiolytica/hypnotica 10,1%, met aanzienlijke inter-institutionele variatie. Analyses voor enkel anxiolytica of enkel hypnotica bedroegen 28,6% en en 23,8% respectievelijk.

Conclusie: Psychofarmacagebruik in detentie vertoont grote variatie tussen instellingen en geslachten. Structurele factoren, zoals de organisatie van de gezondheidszorg en de beschikbaarheid van niet-medicamenteuze alternatieven, beïnvloeden het psychofarmacagebruik aanzienlijk. Beleidsmaatregelen gericht op gestandaardiseerde kwaliteitskaders en multimodale behandelmodellen zijn essentieel voor proportioneel en ethisch verantwoord voorschrijfgedrag.