Iridocyclitis: Adaptatie van Duodecim richtlijn naar Belgische context

Haio: SCHUTYSER Brecht , KUL
Promotor: MATHEI Cathy , KUL
Praktijkopleider: LEENDERS Ria , SCHUTYSER Dirk

Context: Evidence-based richtlijnen omtrent de aanpak van de patiënt met (vermoeden van) (anterieure) uve?tis in de Belgische context bestaan momenteel nog niet. Dankzij de samenwerking tussen EBMPracticeNet en de Finse huisartsenorganisatie Duodecim kregen we de kans om binnen ons masterproefproject de Finse richtlijn omtrent Iridocyclitis en iritis te adapteren naar de Belgische context. Op die manier beschikken de Belgische huisartsen over een wetenschappelijk onderbouwde richtlijn omtrent de aanpak van de patiënt met (anterieure) uve?tis.

Onderzoeksvraag: Dankzij de samenwerking tussen EBMPracticeNet en de Finse huisartsenorganisatie Duodecim kregen we de kans om binnen ons masterproefproject de Finse richtlijn omtrent Iridocyclitis en iritis te adapteren naar de Belgische context. Op die manier beschikken de Belgische huisartsen over een wetenschappelijk onderbouwde richtlijn omtrent de aanpak van de patiënt met (anterieure) uve?tis.

Methode: Vooreerst werden 3 klinische vragen geselecteerd waarop de nieuwe richtlijn een duidelijk antwoord dient te bieden. Vervolgens werd een uitvoerige zoektocht uitgevoerd in de literatuur, op zoek naar wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen voor de eerste lijn omtrent dit onderwerp. De overblijvende richtlijnen werden vervolgens door beide auteurs, onafhankelijk van elkaar, geëvalueerd door middel van het AGREE II instrument. Hierna werd in de nieuwe (geadapteerde) richtlijn een antwoord geboden op de 3 klinische vragen met behulp van de overgebleven richtlijnen. Het adaptatieproces bevat hiernaast ook een implementatiefase. Enerzijds werd door middel van een enqu?te gekeken of er behoefte was aan een richtlijn. Deze enqu?te richtte zich tot zowel huisartsen als oftalmologen. Daarnaast werd de nieuwe richtlijn ook voorgelegd aan het doelpubliek (toekomstige huisartsen) en werden hun belangrijkste bedenkingen in rekening gebracht.

Resultaten: Er werden meerdere databanken doorzocht, waarbij de eerste zoektocht meer dan 5000 publicaties opleverde. Na een uitvoerige selectie bleven 5 richtlijnen over. Deze werden geëvalueerd werden met behulp vnan AGREE II. Vervolgens werd, aan de hand van de geselecteerde richtlijnen, de Duodecim richtlijn geadapteerd tot een nieuwe richtlijn die bruikbaar is in de Belgische context. In het kader van de implementatiefase namen 49 oftalmologen en 51 huisartsen deel aan de vragenlijst. De nieuwe richtlijn werd voorgelegd aan 20 toekomstige huisartsen, waarna gevraagd werd naar hun bedenkingen

Conclusie: Er is nood aan een wetenschappelijk onderbouwde richtlijn die de aanpak van de patiënt met (anterieure) uve?tis behandelt. De adaptatie van de Finse Duodecim richtlijn naar de Belgische context biedt een antwoord op deze nood. De rondvraag bij huisartsen en oftalmologen toont aan dat er momenteel nog geen eenduidig beleid gehanteerd wordt bij de patiënt met anterieure uve?tis. Sleuteltermen: (Anterieure) uve?tis, iritis, iridocyclitis, oog.