Klinisch redeneren: diagnostiek van hartfalen bij COPD-patiënt in de eerste lijn

Vince van Oorschot, KU Leuven

Promotor: Prof. dr. Bert Vaes, KU Leuven

Co-promotor: Tania D'Hollander

Master of Family Medicine

Masterproef Huisartsgeneeskunde

Academiejaar: 2024 – 2025

©Copyright by KU Leuven

Deze masterproef is een examendocument dat niet werd gecorrigeerd voor eventueel vastgestelde fouten. Met uitzondering van het door de wet toegestaan gebruik, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur(s) het overnemen, kopiëren, gebruiken of realiseren van deze uitgave of gedeelten ervan verboden. Voor aanvragen tot of informatie in verband met het overnemen en/of gebruik van gedeelten uit deze publicatie, wendt u zich tot de KU Leuven, Faculteit Geneeskunde, Campus Gasthuisberg O&N2, Herestraat 49 – bus 400, 3000 Leuven.

Voorafgaande schriftelijke toestemming van de promotor(en) is eveneens vereist voor het aanwenden van de in dit afstudeerwerk beschreven (originele) methoden, producten en programma's voor commercieel nut en voor de inzending van deze publicatie ter deelname aan wetenschappelijke prijzen of wedstrijden

Case report

Titel

Klinisch redeneren: diagnostiek van hartfalen bij COPD-patiënt in de eerste lijn

Auteurs

Vince van Oorschot, KU Leuven

Prof. dr. Bert Vaes, KU Leuven

In een oogopslag

In deze casus van een 76-jarige man met COPD wordt klinisch redeneren gebruikt om te bepalen of deze patiënt met kortademigheid verwezen moet worden naar de cardioloog voor hartfalendiagnostiek.

Samenvatting

Casusbeschrijving

Een 76-jarige man met ernstig COPD consulteert wegens toenemende dyspnoe en hoest met veranderd sputum. Bij longauscultatie staat vooral wheezing op de voorgrond. Een behandeling voor een acute COPD-exacerbatie met antibiotica en corticosteroïden wordt door de huisarts gestart. Twee weken later meldt de patiënt zich opnieuw aan met aanhoudende kortademigheid en nu ook malleolaire oedemen.

Differentiaaldiagnose

Tijdens het klinisch redeneren genereren we eerst hypotheses en plaatsen deze in een diagnostisch landschap. Door deze hypotheses systematisch te toetsen, identificeren we een acute COPD-exacerbatie en hartfalen als meest waarschijnlijke diagnoses. Vervolgens bepalen we de ziektewaarschijnlijkheid voor hartfalen met behulp van de wachtkamerkans en klinische argumenten, waarbij een doorverwijsdrempel van 10% voor echocardiografie wordt gekozen. Aanvullende testen zoals ECG en NT-proBNP worden overwogen, waarbij NT-proBNP echter niet zinvol blijkt gezien de reeds overschreden doorverwijsdrempel.

Verloop van de casus

De patiënt wordt verwezen naar de cardioloog, waar de diagnose hartfalen met behouden ejectiefractie (HFpEF) wordt gesteld. Een initiële behandeling met lisdiuretica en onderhoudsbehandeling met empagliflozine en spironolactone leidt tot verbetering van de symptomen. De patiënt wordt nu regelmatig opgevolgd door een multidisciplinair team. Therapietrouw is hoog en bijwerkingen worden goed gemonitord.

Bespreking

Hartfalen komt bij COPD-patiënten significant vaker voor, waarbij diagnostiek wordt bemoeilijkt door symptoomoverlap en beperkingen van NT-proBNP en echocardiografie. Medicamenteuze interacties, zoals tussen β_2-agonisten en β-blokkers, vereisen zorgvuldige afweging. Voor huisartsen is systematisch klinisch redeneren essentieel bij dyspneu, met tijdige inzet van aanvullende tests of cardiologische verwijzingen, om een juiste diagnose te stellen en onderdiagnostiek te voorkomen.

Abstract (Engelstalig)

Title

Clinical reasoning: diagnosis of heart Failure in COPD patients in primary care

Case Report

A 76-year-old man with severe COPD presented with worsening dyspnoea and cough with altered sputum. Wheezing was prominent on lung auscultation. The primary care physician initiated treatment for an acute COPD exacerbation with antibiotics and corticosteroids. Two weeks later, the patient returned with persistent dyspnoea and newly developed ankle oedema.

Differential Diagnosis

Using clinical reasoning, we generated hypotheses and mapped them in a diagnostic landscape. Systematic evaluation identified acute COPD exacerbation and heart failure as the most likely diagnoses. We determined the probability of heart failure using prevalence data and clinical findings, selecting a referral threshold of 10% for echocardiography. Additional tests including ECG and NT-proBNP were considered, but NT-proBNP was deemed unnecessary given the already surpassed referral threshold.

Case Progression

The patient was referred to cardiology, where heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF) was diagnosed. Initial treatment with loop diuretics and maintenance therapy with empagliflozin and spironolactone led to symptom improvement. The patient is now regularly monitored by a multidisciplinary team. Adherence to therapy is high, and side effects are carefully monitored.

Discussion

Heart failure occurs significantly more often in COPD patients, with diagnosis complicated by symptom overlap and the limitations of NT-proBNP and echocardiography. Medication interactions, such as between β_2-agonists and β-blockers, require careful consideration. For general practitioners, systematic clinical reasoning is essential in cases of dyspnoea, with timely use of additional tests or cardiology referrals to ensure accurate diagnosis and prevent underdiagnosis.

Achtergrond

In deze casus beschrijven we het ziekteverloop van een 76-jarige man met een voorgeschiedenis van COPD. Hij werd eerst behandeld voor een acute COPD-exacerbatie (AECOPD), maar de symptomen verergerden ondanks behandeling, wat leidde tot de diagnose van hartfalen (HFpEF). Deze casus is uniek vanwege de complexe comorbiditeit van de patiënt, de aanwezigheid van diagnostische bias, het gebruik van NT-proBNP in de huisartsenpraktijk en het gedetailleerde klinische redeneerproces. Het vormt een waardevolle leerervaring voor artsen in opleiding en professionals die hun diagnostische vaardigheden willen aanscherpen.

Casus

Patiëntinformatie

De patiënt is een 76-jarige man met COPD (GOLD 2E), hypercholesterolemie, voorkamerfibrillatie (succesvol behandeld met ablatie), en aorta-insufficiëntie (behandeld met aortaklepvervanging). Zijn medicatie omvat apixaban, bempedoïnezuur/ezetimibe, pantoprazole, en een combinatie van beclometason dipropionaat/formoterol fumaraat/glycopyrronium. Hij rookt nog steeds (2 sigaretten per dag, 50 pakjaren) en drinkt geen alcohol. Hij woont samen met zijn partner en is zelfredzaam.

In maart 2023 consulteert hij zijn huisarts wegens dyspnoe, toename van hoest en verkleurde fluimen. Er wordt AECOPD vastgesteld en een behandeling gestart met methylprednisolone en amoxicilline-clavulaanzuur. (1,2) De klachten blijven echter aanhouden, zelfs na verlenging van de behandeling door de pneumoloog. Twee weken later consulteert hij opnieuw met blijvende kortademigheid en als nieuw symptoom enkelzwelling.

Anamnese en klinisch onderzoek

ICE

- Ideas: aanslepende bronchitis na COPD-exacerbatie
- Concerns: lichte inspanningen zijn niet meer mogelijk, dit is toch niet normaal?
- Expectations: krachtigere antibioticabehandeling omdat dit in het verleden goed effect had

Anamnese

De patiënt vertelt dat de kortademigheid toeneemt bij inspanningen (dyspnoe d'effort), maar ook in lichtere mate aanwezig is in rust. Hierdoor kost het hem veel moeite om te voet naar de huisartsenpraktijk te komen (ongeveer 300m wandelen). Hij ervaart weinig effect van een puff salbutamol/ipratropiumbromide. Daarnaast kan hij niet meer goed plat neerliggen in bed (orthopnoe). Sinds 1 week is het hem opgevallen dat zijn enkels geleidelijk aan symmetrisch dikker geworden zijn zonder invloed van houding. Het hoesten is nog steeds aanwezig, maar de fluimen zijn terug doorzichtig van kleur.

Klinisch onderzoek

Bij klinisch onderzoek stellen we de volgende parameters vast: bloeddruk 120/80 mmHg – hartfrequentie 100 spm – zuurstofsaturatie 97% - temperatuur 36.8°C – ademhalingsfrequentie 30/minuut. Bij een lengte van 172 cm en een gewicht van 56 kg bekomen we een BMI van 18.9 kg/m². Er is geen gebruik van hulpademhalingsspieren en geen perifere of centrale cyanose zichtbaar. Het lukt hem nog net om in volzinnen te spreken. Hartauscultatie is normaal en bij longauscultatie staan vooral de bibasale fijne crepitaties op de voorgrond met lichte wheezing diffuus verspreid over de longvelden.

Perifeer zijn er bilaterale malleolaire pitting oedemen aanwezig zonder duidelijk verhoogde centraal veneuze druk. De kuiten zijn soepel.

Tijdslijn
Zie figuur 1

Technische onderzoeken
Tijdens de consultatie pneumologie werd er al een bloedname (laag CRP, normale leukocytenformule, negatieve D-dimeren) en een RX-thorax (emfysemateus longbeeld zonder verbreding van de hartschaduw) verricht.

Tijdens de consultatie bij de huisarts een week later wordt er naar aanleiding van de malleolaire oedemen een elektrocardiogram (ECG) en een bloedname met NT-proBNP en uitgevoerd. ECG toont een sinusaal ritme met linker as en een linker anterior hemiblok (zie figuur 2). NT-proBNP is verhoogd en bedraagt 453 ng/l (normaalwaarde < 125 ng/l, grijze zone 125-600 ng/l) bij een nierfunctie met creatinine 1.06 mg/dL (eGFR 68). (3–6)

Differentiaaldiagnose

Klinisch redeneren

Stap 1: hypotheses genereren met diagnostisch landschap
Aan de hand van anamnese en klinisch onderzoek genereren we verschillende hypotheses en plaatsen deze in een diagnostisch landschap met als centraal aandachtspunt dyspnoe (zie figuur 3). Daarrond komen de diagnoses van de binnencirkel (ernstig én behandelbaar) en buitencirkel (minder ernstig en/of minder behandelbaar).

Stap 2: binnencirkel aftoetsen
Vervolgens gaan we de binnencirkel systematisch af en trachten diagnoses uit te sluiten aan de hand van argumenten uit anamnese, klinisch onderzoek en technische onderzoeken.

Als we kijken naar de pneumologische oorzaken dan kunnen we longembolie uitsluiten omdat D-dimeren negatief zijn (sterke uitsluiter). Een AECOPD is mogelijk want klinisch horen we wheezing (zwakke aantoner) en RX-thorax toont een emfysemateus beeld (zwakke aantoner). Een astma-exacerbatie is minder waarschijnlijk, want negatieve voorgeschiedenis. Pneumothorax en longkanker worden uitgesloten door een negatieve RX (zwakke uitsluiter voor longkanker en goede uitsluiter voor pneumothorax), maar CT-thorax (goede uitsluiter voor longkanker en sterke uitsluiter voor pneumothorax) zou hier meer zekerheid bieden. Ook een pneumonie is minder waarschijnlijk door de lage inflammatoire parameters (goede uitsluiter) en het ontbreken van unilaterale afwijkingen bij longauscultatie (zwakke uitsluiter).

Als we kijken naar de cardiovasculaire oorzaken dan kunnen we een acuut hartinfarct uitsluiten omdat er geen ST-veranderingen aanwezig zijn op ECG (goede uitsluiter). Ook ritmestoornissen werden via ECG uitgesloten. Hartfalen en pericardtamponade zijn beide nog mogelijk.

Als we tenslotte kijken naar de overige oorzaken dan kan CO-intoxicatie uitgesloten worden omdat de inwonende partner geen klachten heeft. Een CVA is ook minder waarschijnlijk wegens het subacute verloop en het ontbreken van focale neurologische uitval. Anafylaxie kunnen we ook uitsluiten wegens het subacute verloop en stabiele parameters.

Uiteindelijk denken we in de differentiaaldiagnose vooral aan AECOPD en hartfalen.

Stap 3: ziektewaarschijnlijkheid bepalen

Eerst en vooral is het belangrijk de wachtkamerkans van hartfalen te kennen. Ervaren artsen kunnen die kans vaak inschatten aan de hand van het voorkomen van bepaalde aandoeningen in hun praktijkpopulatie. Een andere mogelijkheid is het opzoeken van de prevalentie. Bij het raadplegen van de Intego databank (www.intego.be) vinden we een prevalentie van 3,88% voor hartfalen. In de internationale literatuur vinden we een prevalentie van 11,8% voor patiënten zonder comorbiditeit van COPD (5,7) en 20,5% voor patiënten met comorbiditeit van COPD (8,9). Het verschil in prevalentie valt mogelijks te verklaren omdat Intego een huisartsenregister is, dat enkel capteert wat huisartsen in hun dagelijkse praktijk registreren, in tegenstelling tot onderzoeken waarin er een assessment gebeurt bij elke patiënt om de aan- of afwezigheid van hartfalen te bepalen. Daarnaast zit de diagnose van hartfalen vaak ook verborgen in andere diagnoses zoals voorkamerfibrillatie en myocardinfarct. (10)

Vervolgens verfijnen we de wachtkamerkans met bevindingen uit onze anamnese en klinisch onderzoek. We doen dit eerst bij een patiënt zonder comorbiditeit van COPD (figuur 4). De aanwezigheid van volgende klinische argumenten zorgen ervoor dat we telkens een halve stap stijgen (zwakke aantoners) in diagnostische zekerheid: orthopnoe, verhoogde hartslag, perifeer oedeem en bibasale crepitaties. De sensitiviteit en specificiteit van deze argumenten worden samengevat in tabel 1. (11–14)

Daarna passen we dit ook toe bij een patiënt met reeds bestaande diagnose van COPD (figuur 5). Dezelfde argumenten zorgen hier niet voor een toename in diagnostische zekerheid. De reden hiervoor is dat bijna alle argumenten noch een aantonende noch een uitsluitende kracht bezitten zoals weergegeven in tabel 2. (8,9,15,16)

Stap 4: verwijsdrempel bepalen

Vervolgens bepalen we de drempel waarbij we de patiënt doorsturen naar de cardioloog voor een echocardiografie ter bevestiging van de diagnose. Hartfalen is een ernstige aandoening die een actie van de huisarts vraagt, maar we willen ook niet elke patiënt onnodig verwijzen omdat dit zorgt voor een belangrijke maatschappelijke kost. Met die gegevens in het achterhoofd rijst de vraag: hoeveel patiënten met een verhaal van dyspnoe en zonder gekend hartfalen wil ik doorsturen naar de cardioloog om één patiënt met hartfalen correct te diagnosticeren? We leggen de drempel op 10%, dus van de 10 mensen die je doorstuurt zal er 1 hartfalen hebben.

Stap 5: bijkomende testen?

Stel dat we tijdens de consultatie anamnese en klinisch onderzoek hebben uitgevoerd, dan rijst de vraag of een ECG en/of bloedname met NT-proBNP nuttig is voor het verkrijgen van extra diagnostische zekerheid. Deze onderzoeken zijn niet belastend, maar kennen wel een kostprijs voor de patiënt. Om deze vraag te beantwoorden bepalen we hiervoor eerst het testveld van deze onderzoeken aan de hand van de aantonende en uitsluitende kracht.

We bepalen eerst het testveld van ECG. Bij patiënten zonder comorbiditeit van COPD heeft een afwijkend ECG een hoge sensitiviteit, maar een lage specificiteit. Hierdoor krijgen we een goede uitsluitende kracht en een zwakke aantonende kracht. (11,12,14) Bij patiënten met comorbiditeit van

COPD heeft een afwijkend ECG een lagere sensitiviteit, maar een hogere specificiteit. Hierdoor krijgen we zowel een zwakke uitsluitende als aantonende kracht. (8,9,15)

Daarna bepalen we het testveld voor NT-proBNP. Bij patiënten zonder comorbiditeit van COPD heeft NT-proBNP een hoge sensitiviteit, maar een lage specificiteit. Hierdoor krijgen we een goede uitsluitende kracht en een zwakke aantonende kracht. (11,17) Bij patiënten met comorbiditeit van COPD heeft NT-proBNP een lagere sensitiviteit en een gelijkaardige specificiteit. Hierdoor krijgen we een zwakke uitsluitende kracht en een onbruikbare aantonende kracht. (9,15)

Bij beide gevallen blijkt dat het bepalen van NT-proBNP niet nuttig was omdat we reeds boven de verwijsdrempel zitten na een afwijkend ECG en een normaal NT-proBNP de kans niet onder de verwijsdrempel kan brengen (figuur 4 en 5). Als het ECG niet afwijkend was geweest bij een patiënt zonder COPD dan dalen we een hele stap en zien we dat het vervolgens bepalen van NT-proBNP wel een meerwaarde kan zijn. Bij een patiënt met COPD is het bepalen van NT-proBNP ook niet nuttig bij een negatief ECG, omdat je dan onder de verwijsdrempel zit en bij een verhoogd NT-proBNP niet terug boven de verwijsdrempel geraakt.

Diagnose

De patiënt wordt vanuit de eerste lijn verwezen naar de cardioloog omdat de verwijsdrempel is bereikt. Door de cardioloog wordt de diagnose gesteld van hartfalen met bewaarde ejectiefractie (HFpEF). De echocardiografische argumenten hiervoor zijn een bewaarde linkerventrikelfunctie met relaxatiestoornis en gedilateerde atria. Verder is er een mitralisklepinsufficiëntie aanwezig, wat eerder een gevolg is van HFpEF.

Diagnostische uitdagingen

Ten eerste is het heel aannemelijk dat je je als arts bij de aanmeldklacht dyspnoe bij deze patiënt vooral gaat focussen op argumenten die een AECOPD aantonen. Hierdoor heb je veel risico op ‘freezing’. Dit betekent dat je als arts je klinisch redeneerproces vroegtijdig gaat stoppen omdat je een goede verklaring gevonden hebt voor de klacht van de patiënt zonder de andere zaken in het diagnostisch landschap uit te sluiten. Deze ‘freezing’ wordt veroorzaakt door vier biases (18):

- anchoring bias (ankerval): teveel waarde hechten aan de eerste informatie die je gekregen hebt (bv. voorgeschiedenis van COPD);
- confirmation bias (bevestigingsval): meer waarde hechten aan argumenten die je eigen hypothese bevestigen (bv. meer waarde hechten aan longauscultatie dan aan vullingsstatus patiënt);
- premature closure bias: het vroegtijdig accepteren van een diagnose zonder de andere differentiaaldiagnoses uit te sluiten (bv. diagnose AECOPD zonder hartfalen uit te sluiten);
- representativeness bias (prototype val): aanname dat een persoon die tot een bepaalde categorie behoort alle eigenschappen van die categorie bezit (bv. wheezing meteen associëren met COPD).

Ten tweede bestaat er het risico dat je de voorkans van een ziekte verkeerd gaat inschatten (base rate neglect bias of voorkansval). Zo is de incidentie van hartfalen in de algemene populatie niet hetzelfde als bij patiënten met COPD.

Ten slotte zorgt de aanwezigheid van COPD er ook voor dat de kracht van de argumenten voor diagnostiek van hartfalen afneemt. Hierdoor wordt het moeilijker om naast COPD ook de diagnose van

hartfalen te stellen. De symptomen van hartfalen worden deels gemaskeerd door de symptomen die ook bij COPD aanwezig zijn. (6)

Verloop van de casus

Behandeling

Tijdens de derde consultatie bij de huisarts met ook optreden van malleolaire oedemen wordt er een behandeling gestart met het lisdiureticum furosemide 40 mg gedurende 5 dagen met goed effect op de dyspnoe en de oedemen. Enkele weken later wordt de diagnose van hartfalen formeel gesteld door de cardioloog en wordt chronische hartfalenmedicatie opgestart. (5) Ten eerste wordt er gestart met empagliflozine 10 mg 1x/d. Dit is een SGLT2-inhibitor en vermindert vooral het aantal hospitalisaties (8.6% in SGLT2-inhibitor groep vs. 11.8% in placebogroep), maar niet het risico op cardiovasculaire sterfte (7.3% in SGLT2-inhibitor groep vs. 8.2% in placebogroep, niet significant). Dezelfde effecten worden waargenomen bij het gebruik van dapagliflozine. (19,20) Ten tweede wordt er gestart met spironolactone 25 mg 1x/d. Dit is een aldosteron receptor blokker (MRA) en bij patiënten met HFpEF zorgt dit voor minder hospitalisaties voor hartfalen (12% in spironolactone groep vs. 14.2% in placebogroep). (21,22)

Follow-up

Sinds diagnose en behandeling van hartfalen zien we dat de patiënt minder consulteert met de klacht van kortademigheid. Verder is er een lichte verbetering van de inspanningsintolerantie en zijn de gezwollen voeten niet meer teruggekomen. Voortaan wordt hij jaarlijks opgevolgd door zowel cardioloog als pneumoloog. Tussendoor komt hij ook op controle bij de huisarts voor routinematig nazicht met ook bloednames (voor cardiovasculaire preventie en opsporen van bijwerkingen medicatie) en motiveren we hem verder voor rookstop. Er is een goede therapietrouw en tolerantie voor de medicatie. De meest frequente bijwerking van een SGLT2-inhibitor is urogenitale candidiasis. Deze bijwerking is nog niet opgetreden. De belangrijkste bijwerking van spironolactone is hyperkaliëmie. Hiervoor worden regelmatig controles via bloedonderzoek verricht: 2 weken na start van de behandeling, vervolgens na drie maanden, zes maanden en indien stabiel dan jaarlijks. (5,23,24)

Bespreking

Hartfalen komt aanzienlijk vaker voor bij patiënten met COPD (20,5%) dan in de algemene populatie (11,8%), wat wordt toegeschreven aan verschillende pathofysiologische mechanismen. Chronische hypoxemie bij COPD leidt tot pulmonale hypertensie en verhoogde rechterventrikelbelasting, wat kan resulteren in cor pulmonale. Bovendien bevorderen systemische ontstekingen door COPD atherosclerose en endotheeldisfunctie, wat bijdraagt aan ischemisch hartfalen. Risicofactoren zoals roken, leeftijd en sedentaire levensstijl spelen een rol in de overlap van COPD en hartfalen. De hyperinflatie van de longen bij COPD verhoogt de intrathoracale druk, wat negatieve effecten heeft op de preload en afterload van het hart. (8,25–28)

Bij patiënten met COPD en hartfalen kunnen medicamenteuze interacties optreden. Langwerkende β_2-agonisten (LABA) en corticosteroïden (COPD) kunnen interageren met β-blokkers en spironolacton (hartfalen). LABA's kunnen theoretisch de effectiviteit van β-blokkers verminderen door tegengestelde effecten op adrenerge receptoren, hoewel recente studies geen verhoogde cardiovasculaire mortaliteit tonen bij gebruik van LABA in combinatie met LAMA. (29) Cardioselectieve β-blokkers, zoals bisoprolol, blijken over het algemeen veilig voor COPD-patiënten zonder significante negatieve invloed

op de longfunctie. (30,31) Inhalatiecorticosteroïden kunnen bij langdurig gebruik leiden tot systemische bijwerkingen zoals verhoogde bloeddruk en vochtretentie, wat problematisch kan zijn voor patiënten met hartfalen, vooral bij stootkuren met orale corticosteroïden. (32)

Een bekend probleem is de onderdiagnostiek van hartfalen bij patiënten met COPD door de overlap in symptomen zoals dyspneu en vermoeidheid. Anamnese en klinisch onderzoek bieden vaak onvoldoende bewijs om hartfalen betrouwbaar aan te tonen of uit te sluiten bij COPD-patiënten, zoals hierboven beschreven bij het klinisch redeneren. (8) Diagnostische hulpmiddelen zoals NT-proBNP zijn eveneens beperkt, omdat verhoogde waarden ook kunnen optreden bij COPD zonder hartfalen. Verhoogd NT-proBNP kan secundair zijn aan hypoxie, wat leidt tot pulmonale hypertensie, verhoogde rechterventrikelbelasting of een verhoogde cardiale stressrespons bij systemische inflammatie. (15,28) Echocardiografie, hoewel de gouden standaard voor de diagnose van hartfalen, kan beperkt worden door technische problemen zoals slechte echogeniciteit door longhyperinflatie. Op RX-thorax kan hyperinflatie leiden tot een versmalling van de cardiothoracale ratio. (25,26) Een verwijzing naar de cardioloog voor echocardiografie is vaak noodzakelijk om hartfalen bij COPD-patiënten aan te tonen of uit te sluiten. Ondanks dat richtlijnen voor huisartsen en GOLD-richtlijnen deze verwijzing niet standaard aanbevelen, kan het waardevol zijn in specifieke gevallen, zoals bij bestaande cardiovasculaire comorbiditeit of wanneer COPD niet alle klachten van dyspneu verklaart. (1,33)

Een recent artikel van NTVG benadrukt de complexiteit van klinisch redeneren bij patiënten met multimorbiditeit, waarbij interacties tussen ziekten de diagnostische nauwkeurigheid bemoeilijken. Traditionele methoden zoals differentiaaldiagnostiek, die gericht zijn op het identificeren van één aandoening die alle symptomen verklaart, blijken vaak ontoereikend, omdat ze kunnen leiden tot overdiagnostiek en ongewenste bevindingen. Het is van groot belang om samen met de patiënt het doel van de diagnostiek te bepalen en nieuwe klachten te verklaren in de context van de bestaande aandoeningen, aangevuld met gericht onderzoek naar mogelijke nieuwe ziekten indien nodig. Bij de gezamenlijke besluitvorming over aanvullende diagnostiek moet de impact van de mogelijke uitkomsten zorgvuldig worden besproken. Dit voorkomt overbelasting door onnodige tests en richt de focus op het welzijn en de gezondheidsdoelen van de patiënt. (34)

Besluit

Qua diagnostiek is het belangrijk voor artsen om bij patiënten met complexe comorbiditeit zoals COPD alert te zijn op de onderdiagnostiek van hartfalen. De aanmeldklacht dyspnoe vereist een systematische benadering waarbij differentiële diagnoses worden afgewogen en aanvullende diagnostische tests zoals echocardiografie tijdig worden ingezet. De interpretatie van NT-proBNP in de huisartsenpraktijk dient met voorzichtigheid te gebeuren, gezien de lagere specificiteit bij patiënten met COPD. Het is belangrijk om klinische en laboratoriumgegevens te combineren en niet te snel een diagnose te bevestigen of uit te sluiten op basis van biomarkers alleen.

Dankwoord

Met veel waardering wil ik mijn promotor Bert Vaes bedanken voor zijn deskundige begeleiding en kritische inzichten. Ook dank aan de werkgroep van ICHO voor het ontwikkelen van een vernieuwend masterproefconcept rond klinisch redeneren. Mijn praktijkopleider Tania D'Hollander verdient erkenning voor haar waardevolle steun. Tot slot dank aan Miek Smeets en Willem Raat voor het zorgvuldig nalezen en hun waardevolle feedback.

Mededelingen

Belangenconflict

De auteurs vermelden geen belangenconflict.

Financiële ondersteuning

Er werd geen financiële ondersteuning ontvangen voor dit manuscript.

Aansprakelijkheid en copyright

Hierbij verklaren alle auteurs akkoord te gaan met de opgelegde regels in verband met aansprakelijkheid en copyright.

Patiënttoestemming

Een geschreven geïnformeerde toestemming werd verkregen van de patiënt ter publicatie van deze gevalsbespreking.

Tabellen

Tabel 1: kracht argumenten bij hartfalen zonder comorbiditeit COPD

	Sensitiviteit	Specificiteit	LR+	LR-	Kracht argument LR+	Kracht argument LR-
Orthopnoe	0.44	0.89	4	1.59	(+)	0
Hartslag > 90	0.23	0.94	3.83	1.22	(+)	0
Perifeer oedeem	0.53	0.72	1.89	1.53	(+)	0
Basale crepitaties	0.51	0.81	2.68	1.65	(+)	0
Afwijkend ECG	0.89	0.56	2.02	5.09	(+)	-
NT-proBNP > 125	0.93	0.65	2.65	9.29	(+)	-

De tabel toont de diagnostische kenmerken van verschillende testen. Sensitiviteit verwijst naar het percentage patiënten met de aandoening dat correct door de test wordt geïdentificeerd (terecht positieven), terwijl specificiteit het percentage patiënten zonder de aandoening aangeeft dat correct wordt herkend (terecht negatieven De positieve likelihood ratio (LR+) wordt berekend als sensitiviteit/(1 - specificiteit) en geeft aan hoe veel waarschijnlijker een positieve testuitslag is bij iemand met de aandoening dan bij iemand zonder de aandoening. De negatieve likelihood ratio (LR-) wordt berekend als (1 - sensitiviteit)/specificiteit en geeft dit aan voor een negatieve testuitslag. Beide likelihood ratio's helpen de diagnostische waarde van een test te beoordelen. De kracht van argumenten wordt beoordeeld aan de hand van de LR-waarde: een LR tussen 1,8 en 5 wordt als zwak beschouwd, een LR tussen 5 en 16 als goed, een LR tussen 16 en 57 als sterk, en een LR hoger dan 57 als zeer sterk.

Tabel 2: kracht argumenten bij hartfalen met comorbiditeit COPD

	Sensitiviteit	Specificiteit	LR+	1/LR-	Kracht argument LR+	Kracht argument LR-
Orthopnoe	0.30	0.75	1.20	1.07	0	0
Hartslag > 90	0.24	0.86	1.70	1.13	0	0
Perifeer oedeem	0.26	0.84	1.63	1.14	0	0
Basale crepitaties	0.37	0.70	1.23	1.11	0	0
Afwijkend ECG	0.63	0.72	2.25	1.95	(+)	(-)
NT-proBNP > 125	0.78	0.56	1.77	2.55	0	(-)

De tabel toont de diagnostische kenmerken van verschillende testen. Sensitiviteit verwijst naar het percentage patiënten met de aandoening dat correct door de test wordt geïdentificeerd (terecht positieven), terwijl specificiteit het percentage patiënten zonder de aandoening aangeeft dat correct wordt herkend (terecht negatieven De positieve likelihood ratio (LR+) wordt berekend als sensitiviteit/(1 - specificiteit) en geeft aan hoe veel waarschijnlijker een positieve testuitslag is bij iemand met de aandoening dan bij iemand zonder de aandoening. De negatieve likelihood ratio (LR-) wordt berekend als (1 - sensitiviteit)/specificiteit en geeft dit aan voor een negatieve testuitslag. Beide likelihood ratio's helpen de diagnostische waarde van een test te beoordelen. De kracht van argumenten wordt beoordeeld aan de hand van de LR-waarde: een LR tussen 1,8 en 5 wordt als zwak beschouwd, een LR tussen 5 en 16 als goed, een LR tussen 16 en 57 als sterk, en een LR hoger dan 57 als zeer sterk.

Figuren

Figuur 1: tijdslijn ziekte-episode



Deze figuur geeft de tijdslijn van de ziekte-episode schematisch weer. De ziekte-episode wordt ingedeeld in week 1, week 2, week 3 en week 6.

Figuur 2: elektrocardiogram



Deze figuur geeft het elektrocardiogram weer dat afgenomen werd bij de huisarts. Het ECG toont een sinusaal ritme met linker as en een linker anterior hemiblok. Er is geen eerder ECG beschikbaar ter vergelijking.

Figuur 3: diagnostisch landschap



Deze figuur toont het diagnostisch landschap. Centraal staat de aanmeldingsklacht aangevuld met geslacht en leeftijd van de patiënt. In de binnencirkel staan diagnoses die ernstig én behandelbaar zijn en in de buitencirkel staan diagnose die minder ernstig en/of minder behandelbaar zijn. De verschillende hypotheses worden ingedeeld in pneumologische oorzaken (blauw), cardiovasculaire oorzaken (rood) en overige oorzaken (zwart).

Figuur 4: klinisch redeneerschema bij hartfalen zonder comorbiditeit COPD



Deze grafiek geeft schematisch het proces van klinisch redeneren weer bij een patiënt zonder COPD. Op de X-as vind je de wachtkamerkans gevolgd door de verschillende argumenten uit anamnese, klinisch onderzoek en technische onderzoeken. Op de Y-as zie je links de ziektekans in log odds en rechts de ziektekans omgerekend naar procenten. We starten bij de wachtkamerkans die 10% bedraagt. Vervolgens stijgen we telkens een halve stap in de grafiek door de aanwezigheid van volgende zwakke aantoners uit anamnese en klinisch onderzoek: orthopnoe, hartslag > 90, perifeer oedeem en basale crepitaties. De aanwezigheid van een afwijkend ECG zorgt voor een stijging van een halve stap. Als het ECG niet afwijkend was dan dalen we een volledige stap (stippellijn). Vervolgens zie je het testveld van het bepalen van NT-proBNP. Als dit afwijkend is dan stijgen we een halve stap en indien dit niet afwijkend is dan dalen we een volledige stap. Het gearceerde deel geeft weer wanneer het nuttig is om NT-proBNP te bepalen. Als het ECG dus afwijkend is, dan is het niet nuttig om NT-proBNP te bepalen, want zelfs al is de test negatief dan geraken we nog niet onder de verwijsdrempel. Als het ECG niet afwijkend is, dan valt de ziektekans binnen het gearceerde veld. Nu is het wel nuttig om NT-proBNP te bepalen want als dit negatief is dan zakken we tot onder de verwijsdrempel.

Figuur 5: klinisch redeneerschema bij hartfalen met comorbiditeit COPD



Deze grafiek geeft schematisch het proces van klinisch redeneren weer bij een patiënt met COPD. Op de X-as vind je de wachtkamerkans gevolgd door de verschillende argumenten uit anamnese, klinisch onderzoek en technische onderzoeken. Op de Y-as zie je links de ziektekans in log odds en rechts de ziektekans omgerekend naar procenten. We starten bij de wachtkamerkans die 20% bedraagt. Vervolgens blijft de ziektekans hetzelfde want de aanwezigheid van argumenten uit anamnese en klinisch onderzoek hebben onvoldoende kracht. De aanwezigheid van een afwijkend ECG zorgt voor een stijging van een halve stap. Als het ECG niet afwijkend was dan dalen we ook een halve stap (stippellijn). Vervolgens zie je het testveld van het bepalen van NT-proBNP. Als dit afwijkend is dan blijft de ziektekans hetzelfde en indien dit niet afwijkend is dan dalen we een halve stap. Het gearceerde deel geeft weer wanneer het nuttig is om NT-proBNP te bepalen. Als het ECG dus afwijkend is, dan is het niet nuttig om NT-proBNP te bepalen, want zelfs al is de test negatief dan geraken we nog niet onder de verwijsdrempel. Als het ECG niet afwijkend is, is het ook niet nuttig om NT-proBNP te bepalen. Zelfs al is de test positief dan geraken we niet terug boven de verwijsdrempel.

Literatuur

1. COPD | NHG-Richtlijnen [Internet]. [cited 2024 Feb 25]. Available from: https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/copd

2. Belgian Antibiotic Policy Coordination Commission Belgische gids voor anti-infectieuze behandeling. 2022;

3. Mueller C, McDonald K, de Boer RA, Maisel A, Cleland JGF, Kozhuharov N, et al. Heart Failure Association of the European Society of Cardiology practical guidance on the use of natriuretic peptide concentrations. Eur J Heart Fail [Internet]. 2019 Jun 1 [cited 2024 Jul 7];21(6):715–31. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ejhf.1494

4. Welsh P, Campbell RT, Mooney L, Kimenai DM, Hayward C, Campbell A, et al. Reference Ranges for NT-proBNP (N-Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide) and Risk Factors for Higher NT-proBNP Concentrations in a Large General Population Cohort. Circ Hear Fail [Internet]. 2022 Oct 1 [cited 2024 Jul 7];15(10):E009427. Available from: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.121.009427

5. Hartfalen | NHG-Richtlijnen [Internet]. [cited 2024 Feb 25]. Available from: https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/hartfalen#volledige-tekst

6. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, Baumbach A, Böhm M, Burri H, et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: Developed by the Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) With the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J [Internet]. 2021 Sep 21 [cited 2024 Feb 25];42(36):3599–726. Available from: https://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368

7. Van Riet EES, Hoes AW, Wagenaar KP, Limburg A, Landman MAJ, Rutten FH. Epidemiology of heart failure: the prevalence of heart failure and ventricular dysfunction in older adults over time. A systematic review. Eur J Heart Fail [Internet]. 2016 Mar 1 [cited 2024 May 21];18(3):242–52. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ejhf.483

8. Rutten FH, Cramer MJM, Grobbee DE, Sachs APE, Kirkels JH, Lammers JWJ, et al. Unrecognized heart failure in elderly patients with stable chronic obstructive pulmonary disease. Eur Heart J [Internet]. 2005 Sep [cited 2024 Jan 21];26(18):1887–94. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15860516/

9. Rutten FH, Moons KGM, Cramer MJM, Grobbee DE, Zuithoff NPA, Lammers JWJ, et al. Recognising heart failure in elderly patients with stable chronic obstructive pulmonary disease in primary care: cross sectional diagnostic study. BMJ [Internet]. 2005 Dec 10 [cited 2024 Jan 21];331(7529):1379–85. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16321994/

10. Smeets M, Henrard S, Aertgeerts B, Cools F, Janssens S, Vaes B. Methods to identify heart failure patients in general practice and their impact on patient characteristics: A systematic review. Int J Cardiol [Internet]. 2018 Apr 15 [cited 2024 Sep 17];257:199–206. Available from: http://www.internationaljournalofcardiology.com/article/S0167527317320855/fulltext

11. Mant J, Doust J, Roalfe A, Barton P, Cowie MR, Glasziou P, et al. Systematic review and individual patient data meta-analysis of diagnosis of heart failure, with modelling of implications of different diagnostic strategies in primary care. Health Technol Assess (Rockv) [Internet]. 2009 Jul 20 [cited 2024 Jul 11];13(32):1–232. Available from: www.hta.ac.uk

12. Kelder JC, Cramer MJ, Van Wijngaarden J, Van Tooren R, Mosterd A, Moons KGM, et al. The Diagnostic Value of Physical Examination and Additional Testing in Primary Care Patients With Suspected Heart Failure. Circulation [Internet]. 2011 Dec 20 [cited 2024 Feb 25];124(25):2865–73. Available from: https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/CIRCULATIONAHA.111.019216

13. Fonseca C, Morais H, Mota T, Matias F, Costa C, Gouveia-Oliveira A, et al. The diagnosis of heart failure in primary care: value of symptoms and signs. Eur J Heart Fail [Internet]. 2004 Oct 1 [cited 2024 Feb 25];6(6):795–800. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1016/j.ejheart.2004.08.002

14. Van Riet EES, Hoes AW, Limburg A, Landman MAJ, Kemperman H, Rutten FH. Extended prediction rule to optimise early detection of heart failure in older persons with non-acute shortness of breath: a cross-sectional study. BMJ Open [Internet]. 2016 [cited 2024 May 21];6(2). Available from: /pmc/articles/PMC4762114/

15. Rutten FH, Cramer MJM, Zuithoff NPA, Lammers JWJ, Verweij W, Grobbee DE, et al. Comparison of B-type natriuretic peptide assays for identifying heart failure in stable elderly patients with a clinical diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease. Eur J Heart Fail [Internet]. 2007 Jun 7 [cited 2024 Jan 21];9(6–7):651–9. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1016/j.ejheart.2007.01.010

16. Boudestein LCM, Rutten FH, Cramer MJ, Lammers JWJ, Hoes AW. The impact of concurrent heart failure on prognosis in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Eur J Heart Fail [Internet]. 2009 Dec [cited 2024 Jan 21];11(12):1182–8. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19887495/

17. Taylor CJ, Ordóñez-Mena JM, Lay-Flurrie SL, Goyder CR, Taylor KS, Jones NR, et al. Natriuretic peptide testing and heart failure diagnosis in primary care: diagnostic accuracy study. Br J Gen Pract [Internet]. 2023 Jan 1 [cited 2024 Feb 25];73(726):e1. Available from: /pmc/articles/PMC9799346/

18. Van den Eynde J. Klinisch redeneren: van model naar competentie. 2022. 168 p.

19. Fitchett D, Butler J, Van De Borne P, Zinman B, Lachin JM, Wanner C, et al. Effects of empagliflozin on risk for cardiovascular death and heart failure hospitalization across the spectrum of heart failure risk in the EMPA-REG OUTCOME® trial. Eur Heart J [Internet]. 2018 Feb 1 [cited 2024 Feb 25];39(5):363–70. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29020355/

20. Anker SD, Butler J, Filippatos G, Ferreira JP, Bocchi E, Böhm M, et al. Empagliflozin in Heart Failure with a Preserved Ejection Fraction. N Engl J Med [Internet]. 2021 Oct 14 [cited 2024 Jul 11];385(16):1451–61. Available from: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2107038

21. Beldhuis IE, Myhre PL, Bristow M, Claggett B, Damman K, Fang JC, et al. Spironolactone in Patients With Heart Failure, Preserved Ejection Fraction, and Worsening Renal Function. J Am Coll Cardiol. 2021 Mar 9;77(9):1211–21.

22. B P, MA P, SF A, R B, IS A, B C, et al. Spironolactone for heart failure with preserved ejection fraction. N Engl J Med [Internet]. 2014 Sep 1 [cited 2024 Feb 25];370(15):10. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24716680/

23. Shah KB, Rao K, Sawyer R, Gottlieb SS. The Adequacy of Laboratory Monitoring in Patients Treated With Spironolactone for Congestive Heart Failure. J Am Coll Cardiol. 2005 Sep 6;46(5):845–9.

24. Desai AS, Liu J, Pfeffer MA, Claggett B, Fleg J, Lewis EF, et al. Incident Hyperkalemia, Hypokalemia, and Clinical Outcomes During Spironolactone Treatment of Heart Failure With Preserved Ejection Fraction: Analysis of the TOPCAT Trial. J Card Fail. 2018 May 1;24(5):313–20.

25. Hawkins NM, Petrie MC, Jhund PS, Chalmers GW, Dunn FG, McMurray JJV. Heart failure and chronic obstructive pulmonary disease: diagnostic pitfalls and epidemiology. Eur J Heart Fail [Internet]. 2009 Feb [cited 2024 Feb 25];11(2):130. Available from: /pmc/articles/PMC2639415/

26. Hesse K, Bourke S, Steer J. Heart failure in patients with COPD exacerbations: Looking below the tip of the iceberg. Respir Med [Internet]. 2022 May 1 [cited 2024 Feb 25];196. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35306385/

27. Pirina P, Martinetti M, Spada C, Zinellu E, Pes R, Chessa E, et al. Prevalence and management of COPD and heart failure comorbidity in the general practitioner setting. Respir Med [Internet]. 2017 [cited 2024 Feb 25];131:1–5. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.rmed.2017.07.059

28. MacDonald MI, Shafuddin E, King PT, Chang CL, Bardin PG, Hancox RJ. Cardiac dysfunction during exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Lancet Respir Med [Internet]. 2016 Feb 1 [cited 2024 Feb 27];4(2):138–48. Available from: http://www.thelancet.com/article/S2213260015005093/fulltext

29. Wedzicha JA, Banerji D, Chapman KR, Vestbo J, Roche N, Ayers RT, et al. Indacaterol-Glycopyrronium versus Salmeterol-Fluticasone for COPD. N Engl J Med [Internet]. 2016 Jun 9 [cited 2024 Sep 17];374(23):2222–34. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27181606/

30. Corrao S, Brunori G, Lupo U, Perticone F. Effectiveness and safety of concurrent beta-blockers and inhaled bronchodilators in COPD with cardiovascular comorbidities. Eur Respir Rev [Internet]. 2017 Sep 30 [cited 2024 Jul 12];26(145). Available from: https://err.ersjournals.com/content/26/145/160123

31. Lipworth B, Skinner D, Devereux G, Thomas V, Jie JLZ, Martin J, et al. Underuse of β-blockers in heart failure and chronic obstructive pulmonary disease. Heart [Internet]. 2016 Dec 1 [cited 2024 Jul 12];102(23):1909–14. Available from: https://heart.bmj.com/content/102/23/1909

32. Canepa M, Franssen FME, Olschewski H, Lainscak M, Böhm M, Tavazzi L, et al. Diagnostic and Therapeutic Gaps in Patients With Heart Failure and Chronic Obstructive Pulmonary Disease. JACC Hear Fail. 2019 Oct 1;7(10):823–33.

33. 2024 GOLD Report - Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease - GOLD [Internet]. [cited 2024 Sep 17]. Available from: https://goldcopd.org/2024-gold-report/

34. Diagnostisch redeneren bij multimorbiditeit | NTVG [Internet]. [cited 2024 Sep 17]. Available from: https://www.ntvg.nl/artikelen/diagnostisch-redeneren-bij-multimorbiditeit?check_logged_in=1

Literatuurstudie

Best BET

Titel	**Diagnostiek van hartfalen bij COPD-patiënt in de eerste lijn**
Gerapporteerd door	Vince van Oorschot
Klinische informatie	Patiënt gekend met COPD waar ook de diagnose van hartfalen wordt gesteld. Is het moeilijker om de diagnose hartfalen te stellen indien patiënt comorbiditeit van COPD heeft?
PICO	• P: patiënt in eerste lijn met klachten suggestief voor hartfalen • I: comorbiditeit van COPD • C: geen comorbiditeit van COPD • O: sensitiviteit en specificiteit van anamnese, klinisch onderzoek en technische onderzoeken
Zoektermen	Diagnosis of "Heart Failure"[Mesh] in patients with "Pulmonary Disease, Chronic Obstructive"[Mesh] in primary care
Datum	16/01/2024
Resultaat (aantal hits)	161
Relevante papers (aantal inclusies)	9

Patiënten zonder comorbiditeit van COPD

<table>
<tr><th>Auteur, datum en land</th><th>Studie type</th><th>Risico op bias</th><th>Patiënt karakteristieken</th><th>Resultaten:
Sens/Spec, LR+/LR-</th></tr>
<tr><td>Mant et al, 2009, Verenigd Koninkrijk (11)</td><td>Systematische review en individuele patiëntdata meta-analyse</td><td>Referentiestandaardbias: gebrek aan een objectieve en universeel overeengekomen definitie voor hartfalen en de variabiliteit in de manier waarop de referentiestandaard wordt toegepast</td><td>15 studies werden geïncludeerd: 5 over patiënten in eerste lijn, 5 over patiënten verwezen van eerste naar tweede lijn en 5 over spoedgevallen.</td><td><table><tr><th></th><th>Sens</th><th>Spec</th><th>LR+</th><th>1/LR-</th></tr><tr><td>Orthopnoe</td><td>0.44</td><td>0.89</td><td>4</td><td>1.59</td></tr><tr><td>Hartslag > 90</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Perifeer oedeem</td><td>0.53</td><td>0.72</td><td>1.89</td><td>1.53</td></tr><tr><td>Basale crepitaties</td><td>0.51</td><td>0.81</td><td>2.68</td><td>1.65</td></tr><tr><td>NT-proBNP > 125</td><td>0.93</td><td>0.65</td><td>2.65</td><td>9.29</td></tr><tr><td>Afwijkend ECG</td><td>0.89</td><td>0.56</td><td>2.02</td><td>5.09</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Kelder et al, 2011, Nederland (12)</td><td>Cross-sectionele diagnostische studie</td><td>Spectrumbias: exclusie van patiënten met acuut hartfalen

Incorporation bias: als referentietest wordt gebruik gemaakt van panel diagnose. Door gebruik te maken van panel diagnose (met interpretatie van anamnese, klinische en technische onderzoeken) is de referentietest niet volledig afhankelijk van de index test. Resultaten van NT-proBNP werden niet gebruikt in panel diagnose.</td><td>721 Nederlandse patiënten met vermoeden van hartfalen door de huisarts; exclusie van patiënten met acuut hartfalen</td><td><table><tr><th></th><th>Sens</th><th>Spec</th><th>LR+</th><th>1/LR-</th></tr><tr><td>Orthopnoe</td><td>0.30</td><td>0.81</td><td>1.58</td><td>1.16</td></tr><tr><td>Hartslag > 90</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Perifeer oedeem</td><td>0.41</td><td>0.78</td><td>1.86</td><td>1.32</td></tr><tr><td>Basale crepitaties</td><td>0.26</td><td>0.81</td><td>2.89</td><td>1.09</td></tr><tr><td>NT-proBNP > 125</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Afwijkend ECG</td><td>0.92</td><td>0.34</td><td>1.39</td><td>4.25</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>Fonseca et al, 2004, Portugal (13)</td>
<td>Cross-sectionele observationele studie</td>
<td>Informatiebias: patiënten werden geselecteerd adhv afwijkende Boston vragenlijst of behandeling met diuretica. Mogelijks heeft niet elke patiënt met hartfalen een afwijkende Boston vragenlijst.</td>
<td>1058 Portugese patiënten die 3 of meer punten scoren op de Boston vragenlijst (anamnese en klinisch onderzoek) of die behandeld worden met lis- of thiazidediuretica</td>
<td>
<table>
<tr><td></td><td>Sens</td><td>Spec</td><td>LR+</td><td>1/LR-</td></tr>
<tr><td>Orthopnoe</td><td>0.25</td><td>0.99</td><td>25</td><td>1.32</td></tr>
<tr><td>Hartslag > 90</td><td>0.23</td><td>0.94</td><td>3.83</td><td>1.22</td></tr>
<tr><td>Perifeer oedeem</td><td>0.56</td><td>0.89</td><td>5.09</td><td>2.02</td></tr>
<tr><td>Basale crepitaties</td><td>0.39</td><td>0.97</td><td>13</td><td>1.47</td></tr>
<tr><td>NT-proBNP > 125</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Afwijkend ECG</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Taylor et al, 2023, Verenigd Koninkrijk (17)</td>
<td>Diagnostische accuraatheids-studie in een populatie-gebaseerd cohort</td>
<td>Verificatiebias: niet bij elke patiënt met verhoogd natriuretisch peptide werd dezelfde referentietest uitgevoerd; bij sommige patiënten werd er geen verdere diagnostische work-up uitgevoerd

Misclassificatie bias: richtlijnen voor diagnose van hartfalen zijn op 15 jaar tijd veel veranderd, waardoor een patiënt die in 2004 werd onderzocht en geen hartfalen had met de criteria in 2018 misschien wel zou gediagnosticeerd worden met hartfalen</td>
<td>229 580 Britse patiënten in eerste lijn met bloedname waarop natriuretische peptide is bepaald tussen 2004-2018</td>
<td>
<table>
<tr><td></td><td>Sens</td><td>Spec</td><td>LR+</td><td>1/LR-</td></tr>
<tr><td>Orthopnoe</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Hartslag > 90</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Perifeer oedeem</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Basale crepitaties</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>NT-proBNP > 125</td><td>0.95</td><td>0.50</td><td>1.9</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Afwijkend ECG</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>Van Riet et al, 2016, Nederland (14)</td>
<td>Cross-sectionele diagnostische studie</td>
<td></td>
<td>585 Nederlandse patiënten van 65 jaar of ouder die lijden aan niet-acute kortademigheid en waarbij de diagnose van hartfalen nog niet gesteld is</td>
<td>
<table>
<tr><td></td><td>Sens</td><td>Spec</td><td>LR+</td><td>1/LR-</td></tr>
<tr><td>Orthopnoe</td><td>0.20</td><td>0.81</td><td>1.05</td><td>1.01</td></tr>
<tr><td>Hartslag > 90</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Perifeer oedeem</td><td>0.49</td><td>0.80</td><td>2.39</td><td>1.56</td></tr>
<tr><td>Basale crepitaties</td><td>0.28</td><td>0.83</td><td>1.68</td><td>1.16</td></tr>
<tr><td>NT-proBNP > 125</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Afwijkend ECG</td><td>0.66</td><td>0.68</td><td>2.03</td><td>1.98</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

Patiënten met comorbiditeit van COPD

<table>
<tr><th>Auteur, datum en land</th><th>Studie type</th><th>Risico op bias</th><th>Patiënt karakteristieken</th><th>Resultaten:
Sens/Spec, LR+/LR-</th></tr>
<tr><td>Rutten et al, 2005, Nederland (9)</td><td>Cross-sectionele diagnostische studie</td><td rowspan="2">De 4 studies zijn afkomstig uit dezelfde studiepopulatie waardoor er weinig variatie is wat betreft patiënten.

Incorporation bias: als referentietest wordt gebruik gemaakt van panel diagnose. Door gebruik te maken van panel diagnose (met interpretatie van anamnese, klinische en technische onderzoeken) is de referentietest niet volledig afhankelijk van de index test. Resultaten van NT-proBNP werden niet gebruikt in panel diagnose.</td><td rowspan="2">1186 patiënten > 65 jaar met diagnose van COPD gesteld door de huisarts en die geen diagnose van hartfalen hebben gesteld door de cardioloog; 405 patiënten tekenden de IC en nemen deel aan de studie.</td><td>
<table>
<tr><td></td><td>Sens</td><td>Spec</td><td>LR+</td><td>1/LR-</td></tr>
<tr><td>Orthopnoe</td><td>0.30</td><td>0.75</td><td>1.20</td><td>1.07</td></tr>
<tr><td>Hartslag > 90</td><td>0.24</td><td>0.86</td><td>1.70</td><td>1.13</td></tr>
<tr><td>Perifeer oedeem</td><td>0.26</td><td>0.84</td><td>1.63</td><td>1.14</td></tr>
<tr><td>Basale crepitaties</td><td>0.37</td><td>0.70</td><td>1.23</td><td>1.11</td></tr>
<tr><td>NT-proBNP > 125</td><td>0.78</td><td>0.56</td><td>1.77</td><td>2.55</td></tr>
<tr><td>Afwijkend ECG</td><td>0.63</td><td>0.72</td><td>2.25</td><td>1.95</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Rutten et al, 2005, Nederland (8)</td><td>Cross-sectionele diagnostische studie</td><td>
<table>
<tr><td></td><td>Sens</td><td>Spec</td><td>LR+</td><td>1/LR-</td></tr>
<tr><td>Orthopnoe</td><td>0.28</td><td>0.76</td><td>1.17</td><td>1.06</td></tr>
<tr><td>Hartslag > 90</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Perifeer oedeem</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Basale crepitaties</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>NT-proBNP > 125</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Afwijkend ECG</td><td>0.64</td><td>0.73</td><td>2.37</td><td>2.03</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>Boudestein et al, 2009, Nederland (16)</td>
<td>Cross-sectionele diagnostische studie</td>
<td rowspan="2">Cfr. supra</td>
<td rowspan="2">Cfr. supra</td>
<td>
<table>
<tr><td></td><td>Sens</td><td>Spec</td><td>LR+</td><td>1/LR-</td></tr>
<tr><td>Orthopnoe</td><td>0.29</td><td>0.74</td><td>1.12</td><td>1.04</td></tr>
<tr><td>Hartslag > 90</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Perifeer oedeem</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Basale crepitaties</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>NT-proBNP > 125</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Afwijkend ECG</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Rutten et al, 2007, Nederland (15)</td>
<td>Cross-sectionele diagnostische studie</td>
<td>
<table>
<tr><td></td><td>Sens</td><td>Spec</td><td>LR+</td><td>1/LR-</td></tr>
<tr><td>Orthopnoe</td><td>0.29</td><td>0.75</td><td>1.16</td><td>1.06</td></tr>
<tr><td>Hartslag > 90</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Perifeer oedeem</td><td>0.26</td><td>0.84</td><td>1.63</td><td>1.14</td></tr>
<tr><td>Basale crepitaties</td><td>0.43</td><td>0.66</td><td>1.26</td><td>1.16</td></tr>
<tr><td>NT-proBNP > 125</td><td>0.77</td><td>0.58</td><td>1.83</td><td>2.52</td></tr>
<tr><td>Afwijkend ECG</td><td>0.61</td><td>0.71</td><td>2.10</td><td>1.82</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

Resultaten

Patiënten zonder comorbiditeit van COPD

	Sensitiviteit	Specificiteit	LR+	LR-	Kracht argument LR+	Kracht argument LR-
Orthopnoe	0.44	0.89	4	1.59	(+)	0
Hartslag > 90	0.23	0.94	3.83	1.22	(+)	0
Perifeer oedeem	0.53	0.72	1.89	1.53	(+)	0
Basale crepitaties	0.51	0.81	2.68	1.65	(+)	0
NT-proBNP > 125	0.93	0.65	2.65	9.29	(+)	-
Afwijkend ECG	0.89	0.56	2.02	5.09	(+)	-

Patiënten met comorbiditeit van COPD

	Sensitiviteit	Specificiteit	LR+	LR-	Kracht argument LR+	Kracht argument LR-
Orthopnoe	0.30	0.75	1.20	1.07	0	0
Hartslag > 90	0.24	0.86	1.70	1.13	0	0
Perifeer oedeem	0.26	0.84	1.63	1.14	0	0
Basale crepitaties	0.37	0.70	1.23	1.11	0	0
NT-proBNP > 125	0.78	0.56	1.77	2.55	0	(-)
Afwijkend ECG	0.63	0.72	2.25	1.95	(+)	(-)

Conclusie

Bij patiënten met comorbiditeit van COPD dan zien we dat argumenten uit zowel anamnese als klinisch onderzoek niet bruikbaar zijn voor het stellen van de diagnose van hartfalen. Een niet-verhoogd pro-BNP is een zwakke uitsluiter en een afwijkend ECG is een zowel een zwakke aantoner als een zwakke uitsluiter.

Bij patiënten zonder comorbiditeit van COPD zien we dat argumenten vanuit anamnese en klinisch onderzoek (orthopnoe, verhoogde hartslag, perifeer oedeem en basale crepitaties) wel zwakke aantoners zijn. Pro-BNP en ECG zijn een goede uitsluiter en een zwakke aantoner.

Bij het vergelijken van de twee groepen zien we dat bij patiënten zonder COPD zowel het klinisch onderzoek als technische onderzoeken een meerwaarde hebben in het stellen van de diagnose. Bij patiënten met COPD hebben anamnese en klinisch onderzoek geen meerwaarde en ook de aantonende en uitsluitende kracht van technische onderzoeken is zwakker.

LOK klinisch redeneren

Op 20 februari 2025 gaf ik een presentatie over klinisch redeneren aan de LOK-groep van Ravels-Weelde-Poppel. Dit was een goede gelegenheid om collega-huisartsen te laten kennismaken met de structuur en methodiek van klinisch redeneren en om samen casussen uit te werken. Vooraf vulden de deelnemers een self-efficacy vragenlijst in om hun eigen ervaring met klinisch redeneren in te schatten. Hieruit bleek dat de meeste collega's al in aanraking waren gekomen met klinisch redeneren, maar dit vooral intuïtief toepasten bij een niet-pluisgevoel. Het systematisch inschatten van argumenten en het concept van drempelgeneeskunde waren voor velen minder gekend en vormden een interessante meerwaarde.

Hoewel ik goed voorbereid was, vond ik het zelf best spannend om de presentatie te geven. Het theoretische gedeelte verliep eerst wat stroef, omdat sommige begrippen voor de deelnemers nieuw of minder concreet waren. Ik hield dit deel bewust beknopt en overzichtelijk, zodat er voldoende tijd was om de concepten in de praktijk toe te passen. De eerste casus betrof een patiënt met typische pijn op de borst. Het opstellen van een diagnostisch landschap verliep vlot, en er was veel interactie. Het inschatten van de sterkte van argumenten en het hanteren van drempelgeneeskunde bleek echter een uitdaging. Ik besprak hoe diagnostische onzekerheid inherent is aan huisartsgeneeskunde en hoe klinisch redeneren kan helpen om hier gestructureerd mee om te gaan.

De tweede casus behandelde hartfalen. Ik merkte dat de collega's het klinisch redeneren bij deze casus vlotter toepasten dan bij de eerste. Ze gingen actiever aan de slag met het afwegen van argumenten en het bepalen van een gezamenlijke actiedrempel. De discussie was boeiend en constructief, vooral over het nut van het bepalen van NT-proBNP in de eerste lijn.

Ik kijk met een positief gevoel terug op deze sessie. Het was boeiend om te zien hoe collega-huisartsen met verschillende ervaringen en denkstijlen klinisch redeneren benaderen. Hoewel ik het in het begin spannend vond, gaf de aanwezige interactie me vertrouwen. De sessie bevestigde voor mij het belang van gestructureerd klinisch redeneren in de eerste lijn en motiveerde me om dit verder te integreren in mijn eigen praktijk. Dit soort bijscholingen voor collega's dragen bij aan een sterke en kritische huisartsgeneeskunde, en ik zie dit als een waardevolle ervaring voor mijn verdere carrière als huisarts.